

VII. MANEJO DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD DE LOS NIÑOS POR PARTE DE LAS MADRES ADOLESCENTES

En esta sección se presentan las características del niño al nacimiento y el manejo de la salud materno-infantil por parte de las madres adolescentes, el estado nutricional de ellas mismas y de sus niños, la lactancia materna y las vacunaciones, así como el cuidado de los niños ante los eventos de morbilidad.

7.1 Peso y talla del niño al nacimiento

7.1.1 Peso al nacimiento

Como se vio en el punto 6.2, el 9 por ciento de los últimos nacimientos (Cuadro 7.1.1) de madres adolescentes - una vez excluido el 27% de las madres que no informaron -, tuvieron menos de 2.500 gramos de peso al nacer. En comparación con mujeres de otras edades al momento del nacimiento, los niños de las adolescentes nacen con menos peso (9% vs. 7%).

Los niños nacidos de adolescentes que tenían 13-16 años de edad al nacimiento, tienen menos peso (10%) que los nacidos de madres de 17-19 años al nacimiento (9%). No hay diferencia entre las zonas urbana (9.2%) y rural (9%). La Región Central presenta la mayor proporción de niños con bajo peso al nacer (13%) y la Oriental la menor (4.3%). El bajo peso se presenta más en las ciudades que tienen entre 50.000 y 700.000 habitantes (11%), que en las ciudades grandes (9.3%) o muy pequeñas (7.3%). De acuerdo con las personas con quienes viven, el bajo peso al nacer se observa más cuando la adolescente vive con uno o ambos padres biológicos (19%) que cuando vive con su propia familia (9.2%). Hay más niños con bajo peso cuando las madres están en la miseria (11%).

7.1.2 Talla al nacimiento

El 41 por ciento de las madres adolescentes no informó sobre el tamaño del niño al nacer; quienes menos informaron son las que viven en hogares con jefe que trabaja en la agricultura o en los servicios. Al excluir a las que no informaron (Cuadro 7.1.2), casi 8 por ciento dice que el niño medía menos de 47 centímetros; el 86 por ciento dice que medía entre 47 y 53 cms. y 6 por ciento dice que el niño medía más de 53 cms.

7.2 Estado nutricional de las madres

Los niveles nutricionales de las madres adolescentes se pueden aproximar a partir de las medidas antropométricas de estatura, peso y perímetro braquial, tomados a las mujeres que tuvieron un hijo desde enero de 1995.

“Se ha encontrado asociación entre la talla materna y el peso del niño al nacimiento, la supervivencia infantil, la mortalidad materna, las complicaciones del

embarazo y del parto y la duración de la lactancia materna”⁷. La talla promedio para las jóvenes es de 154.3 centímetros (Cuadro 7.2), prácticamente igual a la del conjunto de mujeres no embarazadas que tuvieron hijos en los cinco años anteriores a la encuesta: 154.6 cms., pero más alta que para las mujeres mayores de 40 años de edad; 5.2 por ciento de las adolescentes tienen menos de 145 cms., valor que toma la Organización Mundial de la Salud como crítico. Mientras las mujeres más altas se encuentran en los Santanderes, el Litoral Pacífico, Cali y Atlántico-Norte de Bolívar, las de menor altura son las de Cauca-Nariño y Boyacá-Cundinamarca-Meta.

El Índice de Masa Corporal (IMC) relaciona el peso controlando la talla, pues el peso por sí solo es muy sensible a la edad y a la estatura de las personas. Este índice está influenciado por la edad de la madre, el tiempo de lactancia y el tiempo transcurrido desde el nacimiento anterior. “Se ha encontrado relación entre el IMC y el bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal”.

Para estos cálculos se excluyó a las mujeres embarazadas y a quienes tuvieron un nacimiento en los dos meses anteriores a la encuesta, por lo que, en el caso de las adolescentes, se tomó sobre 273 mujeres. El promedio de IMC fue de 22.8, inferior al de todas las mujeres en esta situación, que fue de 24.7. El 5.6 por ciento está en riesgo reproductivo por estar por debajo del IMC de 18.5, valor recomendado por el International Dietary Energy Consultive Group como punto de corte, cifra más alta que la de las mujeres de mayor edad; una de cada cinco adolescentes (20%) tuvo un IMC superior a 25, porcentaje menor que para el resto de mujeres de mayor edad (Cuadro 7.2).

El perímetro braquial también se relaciona con el peso. El promedio para las adolescentes fue de 26.2 centímetros, menos que para las mujeres mayores; casi una de cada diez jóvenes tienen un perímetro inferior a los 23 centímetros, proporción superior a la del resto de mujeres.

7.3 Lactancia Materna

Casi todos (95%) los hijos de adolescentes (Cuadro 7.3.1), nacidos en los 5 años previos a la encuesta, recibieron lactancia materna en algún momento, cifra similar a la obtenida para el total de mujeres (95.5%). Más de tres de cada cinco infantes (66%) iniciaron la lactancia en la primera hora de nacidos, proporción algo superior a la de la totalidad de mujeres (61%) y 87 por ciento inició durante el primer día de nacido, igual que para el resto. Los niños nacidos en la casa iniciaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos (73%), más que los nacidos en hospital (63%), pero los últimos o los que tuvieron asistencia médica en el parto, lactaron alguna vez, más que los nacidos en la casa (96% y 98% vs. 91%).

⁷ **Salud Sexual y Reproductiva en Colombia.** Resultados del a ENDS-2000, Profamilia, Octubre 2000, pág. 151.

En el Cuadro 7.3.2 se muestra que, entre los niños sobrevivientes menores de tres años, hijos de adolescentes, hay 44 por ciento que ya no están lactando, porcentaje que aumenta desde 1.6 por ciento antes de los 4 meses a 32 por ciento entre los 6 y los 9 meses, llegando al ciento por ciento a los 32 meses de edad. Tan solo 9 por ciento tienen lactancia exclusiva: antes de los dos meses de edad solo tres de cada cinco (68%) tienen lactancia exclusiva, pero después de los 7 meses ya no aparece ninguno. El 36 por ciento está lactando y recibiendo alimentación suplementaria y leche de tarro; 10 por ciento lactan y les dan líquidos como agua y jugos; y uno por ciento lactan y reciben solamente agua.

La Prevalencia/Incidencia de la lactancia (Cuadro 7.3.3) para los niños menores de 3 años, que reciben alguna lactancia, es de 19.4 meses, mayor que para los hijos de todas las mujeres (16 meses), pero la mediana es de 11.5 meses, un poco menor que para los hijos de todas las mujeres (13.1 meses). La duración de la lactancia disminuye con la educación de las mujeres. La lactancia en la zona urbana tiene duración similar a la de la zona rural (12 vs. 11 meses), contrariamente a lo observado para el total de mujeres, cuya duración urbana era menor que la rural (12 vs. 16 meses). En la Región Atlántica y las subregiones de Boyacá-Cundinamarca-Meta y Cauca-Nariño dura más la lactancia entre las jóvenes.

Al 80 por ciento de los niños menores de 3 años les dieron leche materna 6 o más veces en las últimas 24 horas, con un promedio de 6.3 alimentaciones por día y 3.5 por noche. La menor proporción de niños amamantados 6 o más veces al día se tiene en las regiones Atlántica y Central.

7.4 Alimentación complementaria

El porcentaje de niños lactantes menores de tres años, hijos de adolescentes, que recibió comidas específicas en las 24 horas antes de la encuesta, aparece en el Cuadro 7.4.1. Mientras 26 por ciento recibió fórmula infantil, a 58 por ciento le dieron otros líquidos, incluyendo jugos de frutas. Las proporciones respectivas para los niños que no están lactando (Cuadro 7.4.2), son más altas: 37 y 78 por ciento, respectivamente. Todas las proporciones para los hijos de adolescentes, son menores que para el total de niños menores de tres años. El aumento de la edad incrementa la proporción de niños a los que se dan líquidos, aunque después de los 16 meses va desapareciendo la fórmula infantil, e incrementándose la frecuencia con que se dan los otros líquidos.

En cuanto a los alimentos sólidos o semisólidos, 59 por ciento de los niños lactantes los recibió durante las 24 horas anteriores a la entrevista, con una frecuencia de 3.2 veces, que aumenta desde 0.3 veces antes de los 4 meses, hasta 4.1 veces a los 6-9 meses de edad. La frecuencia para los niños que no están recibiendo leche materna es más alta: casi 6 veces, contra 3.2 veces de los lactantes. (Las cifras de frecuencia, no aparecen en los Cuadros 7.4.1 y 7.4.2).

Los alimentos sólidos o semisólidos que consumen los niños lactantes son, en primer lugar, granos, trigo, frijol (45%), carne, pollo, pescado (44%), tubérculos, raíces (41%) y frutas, vegetales (40%); vienen después leche, queso, yogurt (33%), aceite, mantequilla (21%) y, por último, frijol, lenteja, soya (16%). Para los niños que ya no están lactando, todas las proporciones son más altas, especialmente cuando se trata de frijol, lenteja, soya, aceite y mantequilla (más del doble).

7.5 Estado nutricional de los niños menores de cinco años

La ENDS-2000 obtuvo el peso y la talla de los niños menores de cinco años hijos de madres adolescentes, con los que se pudo medir la desnutrición crónica (talla baja para la edad), la desnutrición aguda o emaciación (peso bajo para la talla) y la desnutrición global (bajo peso para la edad) (Cuadro 7.5.1) que sufren estos niños.

La *desnutrición crónica* de estos niños es similar a la de todos los niños nacidos en los últimos cinco años: 14 por ciento sufre de retardo en el crecimiento y 2 por ciento padece desnutrición severa (menos que entre todos los niños). Los niños mayores de un año, son los que más están en riesgo de sufrir desnutrición crónica.

La emaciación es del 0.8 por ciento y 0.2 por ciento sufre *desnutrición aguda* severa. Aquí los más afectados son los menores de un año, seguidos por los de uno a dos años, mientras en la totalidad de los niños los más afectados son estos últimos.

En cuanto a la *desnutrición global*, estos niños están mejor que el conjunto de todos los que nacieron en el período 1995-2000: 5.4 por ciento tiene bajo peso para la edad (casi 7 por ciento en el total) y 0.7 por ciento sufre desnutrición global severa. Este tipo de desnutrición aumenta hasta los 35 meses, para luego disminuir.

Todos los tipos de desnutrición disminuyen con el aumento del nivel de educación de la madre y se producen en las regiones Oriental, Atlántica y Central, más que en Bogotá o la Región del Pacífico. Las subregiones que están en peores condiciones son Bolívar-Sucre-Córdoba, Antioquia sin Medellín, Boyacá-Cundinamarca-Meta y Cauca-Nariño (Cuadro 7.5.2).

7.6 Vacunación de los niños

Entre los niños de 12 – 23 meses de edad, hijos de madres adolescentes, 44 por ciento había recibido todas las vacunas en cualquier momento antes de la entrevista (Cuadro 7.6), menos que para el total de niños de estas edades, hijos de mujeres en edad fértil (52%). El 94 por ciento ha sido vacunado contra BCG; 95 por ciento recibió la primera dosis de DPT, pero solo 68 por ciento ha recibido la tercera dosis (77% para el total). El 96 por ciento recibió la primera dosis de Polio

mientras la tercera la recibió el 64 por ciento (71% para el total). El 68 por ciento recibió la vacuna contra sarampión. En la Región Central es donde más les han puesto todas las vacunas y donde hay mayor número de niños con carnet de vacunación.

Entre los niños de 1 a 4 años, las proporciones con carnet y vacunación durante el primer año de vida, son menores para los hijos de madres adolescentes que para el total de mujeres.

7.7 Morbilidad infantil

El 18 por ciento de los niños menores de cinco años hijos de estas mujeres tuvo Infección Respiratoria Aguda (IRA), definida como tos y respiración agitada, en las dos semanas anteriores a la entrevista, más que la totalidad de los menores (18 vs. 13 por ciento). Los niños más afectados fueron los de 6 a 23 meses (Cuadro 7.7.1), no primogénitos, de la zona urbana, de las regiones Atlántica, Pacífico y Oriental, con madres de baja educación. De estos niños con IRA, el 42 por ciento fue llevado a un servicio de salud.

La cuarta parte de los niños (26%), tuvo fiebre o tos, especialmente los de 6 a 23 meses de edad, no primogénitos, de la zona urbana, de las regiones Central, Atlántica y Oriental, de hogares que están en la miseria y madres con educación inferior a secundaria. La mitad de estos niños recibió atención: 39 por ciento en un servicio de salud, 6 por ciento en una droguería y 4 por ciento por curanderos u otros (Cuadro 7.7.2).

En la tercera parte de los hogares (36%) tienen toldillo: en la mayoría de éstos (25%) los niños los usaron la víspera de la entrevista, especialmente en las regiones Pacífico, Atlántico y Oriental. Esta información no se presenta en cuadro.

Los hijos de las adolescentes se enfermaron más con diarrea, que la totalidad de los menores de cinco años. El 18 por ciento tuvo Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) en las dos semanas anteriores a la encuesta (Cuadro 7.7.3), contra solo 14 por ciento para el total. Los más afectados con EDA fueron, como para la IRA, los de 6 a 23 meses de edad; de la zona rural, de las regiones Oriental, Central y Pacífico, lo mismo que de la subregión Atlántico-Norte de Bolívar, con madres de nivel educativo bajo.

Casi 4 de cada 5 madres adolescentes conocen el suero de rehidratación oral (Cuadro 7.7.4); el menor conocimiento lo tienen en Antioquia (sin Medellín), el litoral Pacífico, los Santanderes y Guajira-Cesar-Magdalena (No aparece en el cuadro).

Según el Cuadro 7.7.5, 20 por ciento de los niños de adolescentes que tuvieron EDA, fueron llevados a proveedores de salud, menos que en el total de los niños menores de cinco años enfermos (29%); 27 por ciento de estos niños no recibió tratamiento de rehidratación oral (TRO), ni otros tratamientos como jarabes o

remedios caseros; este porcentaje es mayor que el que muestra la totalidad de los niños enfermos (19%). La mitad de los niños recibió TRO, mientras 60 por ciento de la totalidad de niños con EDA la recibieron. Al 19 por ciento le incrementaron los líquidos, mucho menos que para la totalidad de los niños (34%).

El 92 por ciento de las madres se lava siempre las manos después de limpiar al niño y 8 por ciento no se las lava.

Cuadro 7.1.1
Peso del niño al nacer. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Peso del niño al nacer		Total	Número
	< 2.500 gr	2.500 gr o más		
Edad al nacimiento				
13-16	10.0	90.0	100.0	83.0
17-19	8.7	91.3	100.0	165.5
Orden del nacimiento				
1	10.1	89.9	100.0	213.8
2-3	3.6	96.4	100.0	33.8
4-5	0.0	100.0	100.0	0.9
Zona				
Urbana	9.2	90.8	100.0	180.7
Rural	9.0	91.0	100.0	67.8
Región				
Atlántica	10.5	89.5	100.0	55.4
Oriental	4.3	95.7	100.0	43.4
Central	12.7	87.3	100.0	75.7
Pacífica	8.2	91.8	100.0	39.9
Bogotá	6.4	93.6	100.0	34.0
Nivel de urbanización				
Ciudad >700.000 hab	9.3	90.7	100.0	87.0
Ciudad 50.000-700.000 hab	10.5	89.5	100.0	53.5
Resto urbano	7.3	92.7	100.0	40.1
Rural	9.0	91.0	100.0	67.8
Ocupación del jefe del hogar				
Profesional	20.0	80.0	100.0	5.7
Administrativo	21.7	78.3	100.0	8.4
Comerciante	10.3	89.7	100.0	51.2
Agricultor cta. propia	0.0	100.0	100.0	5.6
Agricultor asalariado rural	7.4	92.6	100.0	40.3
Servicios	4.6	95.4	100.0	38.9
Obrero calificado	8.8	91.2	100.0	32.3
Obrero no calificado	11.4	88.6	100.0	54.2
Sin información	5.9	94.1	100.0	12.0
Índice de NBI				
No pobre	7.8	92.2	100.0	63.3
Pobre	7.3	92.7	100.0	78.7
En miseria	11.3	88.7	100.0	106.6
Con quién viven las adolescentes				
Padres	19.2	80.8	100.0	4.0
Propio hogar	9.2	90.8	100.0	239.0
Otros	0.0	100.0	100.0	5.5
Grupo de edad				
15-17	12.0	88.0	100.0	69.2
18-19	8.0	92.0	100.0	179.3
Nivel de educación				
Sin educación	0.0	100.0	100.0	3.3
Primaria	9.8	90.2	100.0	74.4
Secundaria	8.5	91.5	100.0	168.0
Universitaria	40.3	59.7	100.0	2.8
Total	9.1	90.9	100.0	248.5

Cuadro 7.1.2
Talla del niño al nacer. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Talla al nacer			Total	Número
	Menor de 47 cm	Entre 47 y 53 cm	Mayor de 53 cm		
Edad al nacimiento					
13-16	7.8	86.6	5.6	100.0	64.7
17-19	7.7	85.3	7.0	100.0	135.7
Orden del nacimiento					
1	8.3	85.5	6.2	100.0	172.5
2-3	4.5	86.8	8.7	100.0	27.0
4-5	0.0	100.0	0.0	100.0	0.9
Zona					
Urbana	8.5	84.1	7.4	100.0	151.5
Rural	5.2	90.9	4.0	100.0	48.8
Región					
Atlántica	5.1	88.5	6.4	100.0	43.6
Oriental	9.2	85.1	5.6	100.0	31.1
Central	8.3	86.9	4.9	100.0	65.3
Pacífica	6.1	82.8	11.1	100.0	29.3
Bogotá	10.3	82.9	6.9	100.0	31.1
Nivel de urbanización					
Ciudad >700.000 hab	9.2	83.3	7.5	100.0	77.6
Ciudad 50.000-700.000 hab	7.5	82.2	10.3	100.0	44.9
Resto urbano	8.4	89.0	2.5	100.0	29.1
Rural	5.2	90.9	4.0	100.0	48.8
Ocupación del jefe del hogar					
Profesional	15.1	70.3	14.6	100.0	5.7
Administrativo	11.4	82.7	6.0	100.0	9.3
Comerciante	4.9	84.3	10.8	100.0	42.2
Agricultor cta. propia	0.0	79.5	20.5	100.0	6.0
Agrícola asalariado rural	3.0	94.2	2.7	100.0	27.3
Servicios	3.3	90.6	6.2	100.0	30.2
Obrero calificado	15.4	79.8	4.8	100.0	25.0
Obrero no calificado	13.0	82.2	4.8	100.0	44.9
Sin información	0.0	100.0	0.0	100.0	9.9
Indice de NBI					
No pobre	3.3	86.7	10.0	100.0	56.8
Pobre	10.3	81.7	8.1	100.0	66.2
En miseria	8.8	88.5	2.7	100.0	77.3
Con quién viven las adolescentes					
Padres	0.0	100.0	0.0	100.0	3.2
Propio hogar	8.0	85.2	6.8	100.0	192.6
Otros	0.0	100.0	0.0	100.0	4.5
Grupo de edad					
15-17	11.0	79.4	9.6	100.0	59.1
18-19	6.3	88.4	5.3	100.0	141.2
Nivel de educación					
Sin educación	0.0	100.0	0.0	100.0	1.8
Primaria	6.9	86.7	6.4	100.0	55.0
Secundaria	7.7	85.5	6.8	100.0	140.7
Universitaria	30.4	69.6	0.0	100.0	2.8
Total	7.7	85.7	6.5	100.0	200.3

Cuadro 7.2
Entre mujeres de 15-19, promedio de altura y porcentaje menor de 145 cm, promedio del índice de masa corporal (IMC), porcentaje cuya IMC esta por debajo de 18.5 y por encima de 25.0, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Talla			IMC				Brazo		
	Prome- dio	Porcen- taje < 145	Número	Prome- dio	Porcen- taje < 18.5	Porcen- taje > 25.0	Número	Promedio	Porcen- taje < 23.0	Número
Edad actual de la entrevistada										
15	153.5	0.0	14.0	23.0	0.0	36.9	6.0	25.2	30.7	14.
16	153.7	7.4	46.0	22.2	0.0	8.5	22.0	25.9	4.0	46
17	154.4	7.6	87.0	23.4	8.2	23.9	47.0	26.5	8.1	87
18	154.3	2.4	127.0	22.5	6.4	20.4	92.0	26.1	10.1	126
19	154.6	6.1	139.0	22.8	5.2	19.0	106.0	26.2	7.7	139
Zona										
Urbana	154.5	4.7	282.0	22.7	6.6	20.4	189.0	26.3	7.6	281
Rural	154.0	6.3	131.0	22.9	3.2	18.5	84.0	25.9	11.7	131
Región										
Atlántica	154.9	5.2	97.0	22.8	7.1	19.0	70.0	25.9	14.5	97
Oriental	154.5	4.5	62.0	23.0	6.5	23.0	38.0	26.3	5.5	62
Central	153.9	5.4	116.0	22.4	6.3	19.9	78.0	26.0	11.1	115
Pacífica	154.0	7.4	85.0	23.1	1.4	19.4	55.0	26.3	6.5	85
Bogotá	154.7	2.3	53.0	22.9	6.5	18.7	33.0	26.7	1.7	53
Subregión										
Guajira, Cesar, Magdalena	154.5	4.9	28.0	21.8	8.4	10.2	17.0	25.5	24.8	28
Atlántico, Bolívar Norte	155.7	3.3	39.0	22.9	12.4	17.5	29.0	25.9	10.1	39
Bolívar, Sucre, Córdoba	154.2	7.7	30.0	23.2	0.0	26.7	25.0	26.3	10.7	30
Santanderes	156.9	3.8	25.0	23.2	14.3	37.4	17.0	26.4	13.5	25
Boyacá, C/marca, Meta	152.9	5.0	37.0	22.8	0.0	10.8	20.0	26.2	0.0	37
Antioquia	154.9	5.3	29.0	22.0	4.4	11.5	17.0	25.1	12.4	29
Medellín	153.4	11.1	26.0	22.0	10.0	19.6	20.0	26.1	18.7	26
Caldas, Risaralda, Quindío	153.3	4.6	22.0	23.3	6.6	44.2	15.0	27.0	4.0	21
Tolima, Huila, Caquetá	153.8	2.1	39.0	22.4	4.5	11.3	26.0	26.1	8.8	39
Cauca, Nariño	151.8	14.6	27.0	23.4	0.0	17.4	19.0	25.8	0.0	27
Valle del Cauca	153.5	3.1	23.0	23.5	5.3	31.5	14.0	27.0	13.8	23
Litoral Pacífico	155.9	0.0	17.0	23.1	0.0	21.7	9.0	26.5	8.8	17
Cali	155.8	9.1	19.0	22.0	0.0	7.1	12.0	26.2	4.8	19
Bogotá D.C.	154.7	2.3	53.0	22.9	6.5	18.7	33.0	26.7	1.7	53
Nivel de educación										
Sin educación	156.0	0.0	6.0	26.6	0.0	67.5	3.0	29.1	0.0	6
Primaria	153.1	8.4	155.0	22.8	3.5	19.6	107.0	25.9	11.0	155
Secundaria	155.0	3.4	249.0	22.7	7.2	19.5	160.0	26.3	7.9	248
Universitaria	157.6	0.0	4.0	22.4	0.0	0.0	3.0	25.5	0.0	4
Total	154.3	5.2	413.0	22.8	5.6	19.8	273.0	26.2	8.9	412

Cuadro 7.3.1

Entre los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta porcentaje que recibió lactancia en algún momento, porcentaje que empezó a lactar dentro de la hora siguiente a haber nacido, porcentaje que empezó durante el primer día de nacido, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Tiempo en que inició la lactancia			Número de niños
	Lactó alguna vez	Inició en la primera hora	Inició en el primer día	
Sexo				
Masculino	92.5	63.5	89.8	212
Femenino	97.3	68.0	84.8	187
Edad actual de la madre				
15-17	97.8	63.9	85.8	109
18-19	93.6	66.4	88.0	290
Zona				
Urbana	94.8	66.0	88.3	268
Rural	94.7	65.0	85.6	131
Región				
Atlántica	96.8	68.0	83.8	98
Oriental	95.5	62.8	87.1	65
Central	94.6	61.8	87.9	112
Pacífica	93.9	77.3	88.3	78
Bogotá	91.6	54.7	92.9	48
Subregión				
Guajira, Cesar, Magdalena	100.0	62.4	82.6	24
Atlántico, Bolívar Norte	98.1	71.7	86.0	41
Bolívar, Sucre, Córdoba	92.6	67.7	81.8	33
Santanderes	96.8	65.5	78.4	34
Boyacá, C/marca, Meta	94.1	59.8	97.0	31
Antioquia	91.2	53.2	77.6	27
Medellín	100.0	60.1	88.6	26
Caldas, Risaralda, Quindío	97.7	49.9	94.5	19
Tolima, Huila, Caquetá	91.9	74.7	90.9	40
Cauca, Nariño	93.3	80.5	89.4	29
Valle del Cauca	95.7	64.3	81.6	18
Litoral Pacífico	92.3	76.7	89.1	16
Cali	94.7	87.6	93.6	15
Bogotá D.C.	91.6	54.7	92.9	48
Nivel de educación				
Sin educación	64.1	55.5	67.5	8
Primaria	95.1	70.0	90.8	165
Secundaria	95.7	63.2	85.3	223
Universitaria	100.0	29.3	100.0	3
Asistencia del parto				
Médico	95.1	66.0	88.0	344
Partera	93.0	68.1	85.2	42
Otra o ninguna	91.7	49.0	79.3	13
Lugar del parto				
Hospital del gobierno	96.1	63.2	86.8	252
Clínica privada	97.8	63.4	89.3	40
Casa/otro	90.6	72.7	88.2	108
Total	94.8	65.7	87.4	400

Cuadro 7.3.2
Distribución porcentual de niños vivos menores de 3 años por tipo de lactancia,
según edad del niño en meses. Adolescentes, ENDS-2000

Edad del niño en meses	No está lactando	Niños que lactan				Total	Alimentación con biberón	Número de niños sobrevivientes
		Lactancia exclusiva	Lactan y reciben					
			Solo agua	Líquidos (agua/jugos)	Suplementos leche de tarro			
Niños de 0-9 meses								
0-3 meses	1.6	41.9	5.8	36.3	14.4	100.0	47.6	55
4-5 meses	8.8	9.7	0.0	31.8	49.7	100.0	64.1	33
6-9 meses	32.0	1.7	0.0	2.7	63.6	100.0	42.2	62
Meses desde el nacimiento								
0-1	3.4	67.8	3.1	13.6	12.1	100.0	34.4	26
2-3	0.0	19.2	8.1	56.2	16.5	100.0	59.2	29
4-5	8.8	9.7	0.0	31.8	49.7	100.0	64.1	33
6-7	30.9	3.0	0.0	4.7	61.5	100.0	44.7	36
8-9	33.6	0.0	0.0	0.0	66.4	100.0	38.8	26
10-11	50.3	0.0	0.0	0.0	49.7	100.0	18.9	25
12-13	54.2	0.0	0.0	0.0	45.8	100.0	23.1	16
14-15	59.3	0.0	0.0	0.0	40.7	100.0	23.2	14
16-17	71.1	0.0	0.0	0.0	28.9	100.0	17.5	22
18-19	73.9	0.0	0.0	0.0	26.1	100.0	21.4	16
20-21	75.2	0.0	0.0	0.0	24.8	100.0	6.8	13
22-23	89.9	0.0	0.0	0.0	10.1	100.0	0.0	17
24-25	60.6	0.0	0.0	0.0	39.4	100.0	0.0	7
26-27	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	4
28-29	87.5	0.0	0.0	0.0	12.5	100.0	0.0	8
30-31	92.2	0.0	0.0	0.0	7.8	100.0	0.0	10
32-33	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	1
34-35	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	5
Total	44.2	8.9	1.0	10.4	35.5	100.0	30.3	309

Cuadro 7.3.3

Duración mediana de la lactancia, por tipo de lactancia entre niños menores de tres años, y el porcentaje de niños menores de seis meses que lactaron seis o más veces en las 24 horas anteriores a la encuesta, y promedio del número de comidas (día/noche), según características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Duración mediana en meses (menores de 3 años)				Intensidad de la lactancia (menores de 6 meses)			
	Alguna lactancia	Lactancia exclusiva	Lactancia Predominante	Número de niños	Pecho 6+ veces/ en últimas 24 horas	Veces durante el día	Veces durante la noche	Número de niños
Sexo								
Masculino	10.5	1.8	1.9	168.0	75.0	6.5	3.4	50
Femenino	12.8	0.7	1.3	147.0	86.2	6.0	3.6	38
Zona								
Urbana	12.4	1.5	1.6	210.0	79.7	6.4	3.8	59
Rural	10.7	1.7	1.9	105.0	80.0	6.1	3.0	29
Región								
Atlántica	13.5	0.9	0.9	77.0	68.1	4.9	3.3	24
Oriental	11.5	1.0	1.0	51.0	86.6	5.7	3.4	14
Central	7.9	1.2	1.8	90.0	73.2	6.7	3.0	23
Pacífica	15.0	2.2	2.2	61.0	94.0	7.5	4.7	14
Bogotá	11.2	2.8	3.1	36.0	90.8	7.5	3.6	13
Subregión								
Guajira, Cesar, Magdalena	12.4	1.3	1.3	21.0	56.8	4.2	3.3	10
Atlántico, Bolívar Norte	14.8	0.6	0.6	31.0	57.8	5.2	1.9	6
Bolívar, Sucre, Córdoba	13.2	1.7	1.7	25.0	88.7	5.4	4.3	8
Santanderes	10.8	0.4	0.4	24.0	100.0	6.3	3.8	7
Boyacá, C/marca, Meta	15.8	2.1	2.1	27.0	73.6	5.2	3.0	7
Antioquia	0.7	0.4	0.7	21.0	65.1	6.2	3.6	5
Medellín	5.2	1.9	1.9	21.0	45.4	6.0	3.2	4
Caldas, Risaralda, Quindío	9.5	2.0	2.0	17.0	84.5	7.5	2.9	6
Tolima, Huila, Caquetá	6.4	1.9	2.2	32.0	81.8	6.6	2.8	9
Cauca, Nariño	13.0	2.2	2.2	24.0	100.0	7.5	5.5	7
Valle del Cauca	6.3	1.6	1.6	13.0	0.0	1.0	0.0	1
Litoral Pacífico	6.4	5.9	5.9	11.0	100.0	11.0	4.8	3
Cali	4.5	0.8	0.8	13.0	100.0	5.0	3.7	2
Bogotá D.C	11.2	2.8	3.1	36.0	90.8	7.5	3.6	13
Nivel de educación								
Sin educación	15.5	1.9	1.9	6.0	82.1	8.8	6.2	4
Primaria	14.2	1.3	1.3	124.0	80.1	6.7	3.2	32
Secundaria	9.1	1.7	2.0	182.0	79.5	5.9	3.5	52
Universitaria	9.5	9.5	9.5	3.0	-	-	-	0
Total	11.5	1.6	1.7	315.0	79.8	6.3	3.5	88
Promedio prevalencia - incidencia								
Promedio	14.3	2.6	2.8	96.7	-	-	-	-
Prevalencia / Incidencia	19.4	3.1	3.4	-	-	-	-	-

Cuadro 7.4.1
 Porcentaje de niños que están lactando menores de tres años que recibieron alguna comida específica en las 24 horas antes de la encuesta por tipo de alimentación y edad del niño. Adolescencia, ENDS-2000

Edad del niño en meses	Tipo de alimentación recibida en las 24 horas anteriores										Número de niños
	Fórmula Infantil	Otra leche queso yoghurt	Otro líquido	Granos, trigo, frijol	Frutas, vegetales	Tubérculos, raíces	Frijol, lenteja, soya	Carne, pollo, pescado,	Sólido o semi-sólido	Aceite mantequilla	
Meses desde el nacimiento											
0-1	10.6	3.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25
2-3	30.6	31.6	32.1	8.9	6.7	1.8	2.9	0.0	13.7	0.0	29
4-5	35.3	15.2	58.1	20.6	31.3	22.8	6.0	23.6	45.3	6.3	30
6-7	41.6	27.0	68.4	52.3	48.2	54.7	15.9	49.3	84.0	10.0	25
8-9	25.4	45.2	84.0	77.0	63.3	76.1	37.9	78.8	100.0	46.1	17
10-11	24.0	55.4	80.9	84.7	70.4	77.3	30.9	84.4	100.0	45.6	12
12-13	9.2	41.8	100.0	88.4	79.3	78.8	0.0	100.0	100.0	52.6	7
14-15	30.0	69.2	91.2	83.5	86.9	100.0	55.0	100.0	100.0	40.2	6
16-17	22.8	73.8	100.0	100.0	100.0	73.6	57.1	88.6	100.0	39.6	6
18-23	15.7	63.1	75.5	100.0	44.6	80.0	26.9	88.3	100.0	49.1	9
24-29	0.0	80.2	80.2	100.0	100.0	80.2	19.8	100.0	100.0	100.0	4
30-35	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1
Niños de 0-9 meses											
0-3 meses	21.4	18.7	18.9	4.8	3.6	1.0	1.6	0.0	7.4	0.0	54
4-5 meses	35.3	15.2	58.1	20.6	31.3	22.8	6.0	23.6	45.3	6.3	30
6-9 meses	35.0	34.4	74.8	62.4	54.4	63.5	24.9	61.4	90.5	24.7	42
Total	26.3	33.4	57.6	44.8	40.1	41.4	16.2	43.5	59.0	20.8	172

Cuadro 7.4.2
 Porcentaje de niños que no están lactando menores de tres años que recibieron alguna comida específica en las 24 horas antes de la encuesta por tipo de alimentación y edad del niño. Adolescentes, ENDS-2000

Edad del niño en meses	Tipo de alimentación recibida en las 24 horas anteriores										Número de niños
	Fórmula infantil	Otra leche queso yoghurt	Otro líquido	Granos, trigo, frijol	Frutas, vegetales	Tubérculos, raíces	Frijol, lenteja, soya	Carne, pollo, pescado,	Sólido o semi-sólido	Aceite mantequilla	
Meses desde el nacimiento											
0-1	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
2-3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0
4-5	38.1	71.3	71.3	38.1	38.1	38.1	0.0	71.3	71.3	38.1	3
6-7	54.5	40.1	66.1	40.7	60.5	39.9	16.0	39.1	78.4	15.7	11
8-9	48.5	67.7	80.2	76.5	76.9	71.9	45.7	46.8	100.0	69.9	9
10-11	50.9	42.1	85.6	72.2	76.6	47.4	36.5	63.0	94.1	25.2	13
12-13	48.7	70.1	76.3	88.7	100.0	85.5	50.8	80.9	100.0	51.5	9
14-15	52.6	61.8	71.4	57.1	29.4	60.7	29.8	54.0	83.2	74.3	9
16-17	23.1	47.5	75.9	84.5	53.1	73.6	37.2	79.3	84.5	39.2	16
18-23	30.8	57.0	80.2	75.3	70.5	66.5	35.4	73.4	85.6	44.7	37
24-29	23.8	55.7	86.5	74.8	75.2	80.2	28.9	74.3	86.5	52.4	16
30-35	27.0	50.7	74.9	51.9	74.9	68.0	34.9	74.9	74.9	48.6	15
Niños de 0-9 meses											
0-3 meses	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
4-5 meses	38.1	71.3	71.3	38.1	38.1	38.1	0.0	71.3	71.3	38.1	3
6-9 meses	51.9	52.2	72.3	56.4	67.7	54.0	29.0	42.5	87.9	39.5	20
Total	36.7	54.0	78.3	69.2	67.8	65.3	33.6	67.6	85.5	44.6	136

Cuadro 7.5.1

Porcentaje de niños menores de cinco años clasificados como desnutridos según los tres índices antropométricos de estado nutricional: altura para la edad, peso para la altura, y peso para la edad, por características demográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Desnutrición crónica (Talla para la edad)			Desnutrición aguda (Peso para la talla)			Desnutrición Global (Peso para la edad)			Número de niños
	debajo de -3 DE	debajo de -2 DE	Pro- medio	debajo de -3 DE	debajo de -2 DE	Pro- medio	debajo de -3 DE	debajo de -2 DE	Pro- medio	
Edad del niño										
Menos de 6 meses	0.0	2.7	-0.3	0.0	1.1	0.7	0.0	1.1	0.3	83
6-11 meses	0.0	6.6	-0.6	1.0	1.0	0.5	1.0	2.6	-0.1	78
12-23 meses	4.4	25.2	-1.3	0.0	0.9	-0.1	0.9	9.5	-0.8	102
24-35 meses	5.6	19.5	-0.9	0.0	0.0	-0.1	1.9	11.6	-0.7	40
36-47 meses	3.0	6.5	-0.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	-0.5	26
48-59 meses	0.0	38.7	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	-0.9	10
Sexo										
Masculino	1.6	13.0	-0.8	0.5	0.5	0.3	0.5	4.3	-0.3	172
Femenino	2.9	14.5	-0.8	0.0	1.1	0.2	1.0	6.6	-0.4	165
Orden del nacimiento										
1	2.0	12.5	-0.8	0.0	0.3	0.3	0.6	4.2	-0.3	286
2-3	3.8	21.0	-0.9	1.6	1.6	0.2	1.6	10.8	-0.4	50
4-5	0.0	0.0	-1.3	0.0	49.4	-1.7	0.0	49.4	-2.2	2
Intervalo del nacimiento										
Primer nacimiento	2.0	12.7	-0.8	0.0	0.3	0.3	0.6	4.2	-0.3	287
Menos de 24 meses	5.0	23.6	-1.1	2.1	4.5	0.1	2.1	16.7	-0.6	38
24-47 meses	0.0	6.8	-0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	-0.2	13
Total	2.2	13.7	-0.8	0.2	0.8	0.3	0.7	5.4	-0.3	338

Cuadro 7.5.2
 Porcentaje de niños menores de cinco años clasificados como desnutridos según los tres índices antropométricos de estado nutricional: Altura para la edad, peso para la altura, y peso para la edad, por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Desnutrición crónica (Talla para la edad)			Desnutrición aguda (Peso para la talla)			Desnutrición Global (Peso para la edad)			Número de niños
	debajo de -3 DE	debajo de -2 DE	Pro- medio	debajo de -3 DE	debajo de -2 DE	Pro- medio	debajo de -3 DE	debajo de -2 DE	Pro- medio	
Zona										
Urbana	2.6	11.4	-0.8	0.4	0.8	0.3	0.7	4.5	-0.3	223
Rural	1.4	18.2	-0.9	0.0	0.8	0.3	0.8	7.2	-0.4	115
Región										
Atlántica	2.5	13.3	-0.9	0.9	2.0	0.1	0.9	8.5	-0.5	85
Oriental	2.1	16.2	-0.8	0.0	1.8	0.2	1.8	5.7	-0.3	50
Central	3.2	16.2	-0.9	0.0	0.0	0.3	0.7	5.2	-0.3	101
Pacífica	1.7	11.5	-0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	4.4	-0.3	68
Bogotá	0.0	8.3	-0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	-0.0	35
Subregión										
Guajira, Cesar, Magdalena	0.0	6.9	-0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	3.4	-0.3	20
Atlántico, Bolívar Norte	5.4	9.4	-0.9	2.0	2.0	0.1	2.0	7.3	-0.5	39
Bolívar, Sucre, Córdoba	0.0	24.5	-1.1	0.0	3.5	0.2	0.0	14.6	-0.6	26
Santanderes	4.8	14.5	-0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	4.8	-0.2	22
Boyacá, C/marca, Meta	0.0	17.6	-0.8	0.0	3.3	0.2	3.3	6.5	-0.4	27
Antioquia	8.8	27.4	-1.1	0.0	0.0	0.2	3.0	12.5	-0.5	25
Medellín	0.0	8.7	-0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	4.4	-0.4	25
Caldas, Risaralda, Quindío	6.5	9.3	-0.8	0.0	0.0	0.7	0.0	6.5	0.0	15
Tolima, Huila, Caquetá	0.0	16.7	-0.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	-0.2	36
Cauca, Nariño	4.4	20.1	-0.8	0.0	0.0	0.3	0.0	6.5	-0.2	27
Valle del Cauca	0.0	4.5	-0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.4	17
Litoral Pacífico	0.0	12.9	-0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	9.3	-0.3	13
Cali	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.3	11
Bogotá D.C	0.0	8.3	-0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	-0.0	35
Nivel de educación										
Sin educación	0.0	49.8	-1.2	0.0	12.4	-0.1	0.0	25.0	-0.8	7
Primaria	3.0	18.6	-1.0	0.0	0.6	0.3	1.2	7.0	-0.4	142
Secundaria	1.8	8.8	-0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	3.5	-0.2	187
Universitaria	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.6	2
Total	2.2	13.7	-0.8	0.2	0.8	0.3	0.7	5.4	-0.3	338

Cuadro 7.6
Entre niños 12-23 meses de edad, el porcentaje que ha recibido cada vacuna por el tiempo de la encuesta
(según el carnet de vacunas o la madre) y el porcentaje con carnet de vacunas, por características sociodemográficas.
Adolescentes, ENDS-2000

Característica	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio al nacer	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Saram- pión	Todas	Nin- guna	Con carnet	Número de niños
Sexo del niño													
Masculino	91.8	94.2	81.9	63.0	61.8	95.5	79.5	60.5	71.3	43.9	2.4	56.6	63
Femenino	95.5	96.4	85.9	72.9	69.9	96.4	87.7	68.2	63.8	44.9	0.0	70.0	55
Orden del nacimiento													
1	93.4	97.3	87.2	70.8	64.2	98.1	86.7	66.9	69.9	46.5	1.5	63.5	102
2-3	94.1	81.5	60.6	45.7	74.8	81.5	60.6	44.7	53.6	30.2	0.0	58.5	15
Zona													
Urbana	93.6	95.4	83.6	67.4	65.7	95.4	81.7	61.4	66.3	45.9	1.1	64.0	79
Rural	93.4	95.0	84.1	68.0	65.3	97.1	86.6	69.5	70.8	41.2	1.7	60.5	38
Región													
Atlántica	91.6	96.9	86.5	69.6	57.2	96.9	80.8	57.3	65.3	37.3	0.0	55.6	29
Oriental	87.2	93.9	76.7	59.7	53.7	93.9	76.7	59.7	57.6	45.8	0.0	53.6	18
Central	98.3	95.1	78.3	70.6	80.7	97.2	81.2	71.9	74.0	57.1	1.7	77.3	40
Pacífica	100.0	95.8	92.1	74.9	67.4	95.8	92.1	64.2	67.0	31.4	0.0	54.4	20
Bogotá	79.4	92.1	92.1	50.4	48.9	92.1	92.1	60.4	69.7	39.2	7.9	60.4	11
Nivel de urbanización													
Ciudad >700.000 hab	91.4	94.7	87.3	66.1	64.6	94.7	87.3	58.4	64.6	39.1	2.4	62.9	36
Ciudad 50.000-700.000 hab	90.3	91.4	68.0	58.9	67.9	91.4	71.9	55.4	67.2	50.7	0.0	64.1	20
Resto urbano	100.0	100.0	91.7	77.0	65.7	100.0	81.6	71.4	68.2	52.5	0.0	65.7	23
Rural	93.4	95.0	84.1	68.0	65.3	97.1	86.6	69.5	70.8	41.2	1.7	60.5	38
Ocupación del jefe del hogar													
Profesional	100.0	100.0	100.0	48.2	75.3	100.0	84.9	48.2	63.2	48.2	0.0	84.9	5
Administrativo	100.0	100.0	100.0	78.4	78.4	100.0	100.0	78.4	76.3	54.7	0.0	78.4	4
Comerciante	92.4	95.7	84.1	63.0	56.0	95.7	87.2	68.2	73.9	48.0	0.0	61.7	21
Agricultor cta. propia	100.0	100.0	84.8	51.2	51.2	100.0	84.8	51.2	100.0	51.2	0.0	58.8	5
Agricultor asalariado rural	92.1	91.7	80.0	66.5	62.5	95.3	83.9	69.0	70.8	40.9	2.9	59.2	23
Servicios	94.2	100.0	81.4	76.7	82.2	100.0	89.1	70.9	68.7	58.2	0.0	81.8	15
Obrero calificado	92.5	86.6	71.6	73.9	73.9	86.6	71.6	50.8	50.7	29.9	0.0	51.2	14
Obrero no calificado	91.6	96.8	86.7	68.4	64.1	96.8	80.9	61.0	66.0	44.8	3.2	59.9	26
Sin información	100.0	100.0	100.0	75.4	45.1	100.0	75.4	75.4	45.1	20.5	0.0	44.5	4
Índice de NBI													
No pobre	95.9	95.9	90.1	69.1	92.4	94.2	81.2	61.9	74.1	45.0	0.0	66.8	26
Pobre	90.9	97.5	87.7	72.1	55.9	97.5	91.8	69.6	62.4	51.5	2.5	62.0	34
En miseria	94.0	93.6	78.5	64.2	59.3	95.8	79.2	61.7	68.1	39.9	1.2	61.6	57
Con quién viven las adolescentes													
Propio hogar	93.1	96.1	84.8	69.6	66.8	95.7	85.2	65.9	65.7	44.9	1.4	66.8	110
Otros	100.0	82.0	67.6	35.5	46.5	100.0	53.3	35.5	100.0	35.5	0.0	0.0	7
Grupo de edad													
15-17	97.9	94.6	88.7	72.6	58.0	94.6	94.6	69.9	68.5	49.3	2.1	58.2	32
18-19	91.9	95.5	81.9	65.7	68.4	96.5	79.1	61.9	67.5	42.5	1.0	64.6	85
Nivel de educación													
Sin educación	50.4	50.4	0.0	0.0	100.0	50.4	50.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2
Primaria	95.4	96.2	85.9	64.1	59.4	95.2	88.8	65.6	62.0	38.7	1.7	61.5	40
Secundaria	93.3	95.6	84.0	71.1	69.5	97.3	80.4	64.6	73.8	48.8	1.2	62.4	72
Universitaria	100.0	100.0	100.0	69.6	30.4	100.0	100.0	69.6	40.3	40.3	0.0	70.7	3
Total	93.5	95.2	83.8	67.6	65.6	95.9	83.3	64.1	67.8	44.4	1.3	62.9	117

Cuadro 7.7.1

Prevalencia y tratamiento de IRA:

Entre todos los niños menores de 5 años de edad, porcentaje que estuvo enfermo con tos acompañada con respiración agitada durante las dos semanas anteriores a la encuesta y entre los niños enfermos, porcentaje que recibió tratamiento específico, según las características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Prevalencia infección respiratoria aguda y respiración rápida	Con tos llevados a servicio de salud	Número de niños
Edad del niño			
Menos de 6 meses	13.6	35.5	88
6-11 meses	21.6	49.5	87
12-23 meses	20.9	31.7	117
24-35 meses	14.3	74.4	55
36-37 meses	13.7	39.7	28
48-59 meses	6.9	0.0	13
Sexo			
Masculino	17.7	43.3	203
Femenino	17.3	41.2	186
Orden de nacimiento			
1	16.9	45.2	330
2-3	20.0	31.3	56
4-5	49.4	0.0	2
Zona			
Urbana	19.3	47.0	263
Rural	13.6	28.3	125
Región			
Atlántica	20.4	36.7	95
Oriental	17.7	19.0	62
Central	16.2	59.8	110
Pacífica	18.6	21.7	74
Bogotá	12.5	100.0	47
Nivel de urbanización			
Ciudad >700.000 hab	19.2	50.8	127
Ciudad 50.000-700.000 hab	20.8	32.1	75
Resto urbano	17.9	59.7	61
Rural	13.6	28.3	125
Ocupación del jefe del hogar			
Profesional	26.3	50.3	8
Administrativo	22.8	62.2	12
Comerciante	30.4	45.6	68
Agricultor cta. propia	7.0	0.0	17
Agrícola asalariado rural	17.4	17.1	82
Servicios	15.5	59.4	59
Obrero calificado	9.1	100.0	48
Obrero no calificado	14.2	36.6	80
Sin información	14.0	0.0	13
Índice de NBI			
No pobre	18.2	38.2	93
Pobre	13.8	60.0	112
En miseria	19.4	36.6	184
Con quién viven las adolescentes			
Padres	27.7	100.0	4
Propio hogar	17.1	38.2	371
Otros	26.2	100.0	13
Grupo de edad			
15-17	16.2	43.3	107
18-19	18.0	42.0	282
Nivel de educación			
Sin educación	24.8	0.0	7
Primaria	16.8	25.9	160
Secundaria	18.0	55.5	218
Universitaria	0.0	-	3
Total	17.5	42.3	388

Cuadro 7.7.2
Prevalencia de fiebre o tos, y fuentes de tratamiento por características seleccionadas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Entre los niños con fiebre o tos, porcentaje llevado a:									Numero de niños
	Niños con fiebre o tos	Doctor	Hospital	Centro de salud	Puesto de salud	Droguería	Curandero	Otro	Nadie lo atendió	
Edad del niño										
Menos de 6 meses	19.3	6.3	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	5.0	51.6	88
6-11 meses	28.9	6.5	29.1	12.7	2.3	3.9	0.0	0.0	37.8	87
12-23 meses	31.2	5.0	14.1	11.7	0.0	11.1	5.2	3.5	49.2	117
24-35 meses	24.6	5.3	14.5	27.0	0.0	5.5	0.0	0.0	47.7	55
36-37 meses	25.8	0.0	10.8	5.9	10.5	0.0	0.0	0.0	72.7	28
48-59 meses	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13
Sexo										
Masculino	25.4	8.9	20.2	16.1	0.0	6.3	2.3	2.4	41.7	203
Femenino	26.7	1.4	9.7	19.3	2.7	5.2	1.4	1.8	56.7	186
Orden de nacimiento										
1	24.4	5.6	16.9	17.2	1.6	5.8	2.3	1.6	47.6	330
2-3	34.9	3.7	8.4	20.6	0.0	5.6	0.0	4.6	52.6	56
4-5	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	2
Zona										
Urbana	27.0	5.1	18.1	22.1	0.8	7.1	0.0	2.5	41.5	263
Rural	24.1	5.4	7.9	7.4	2.5	2.5	6.3	1.3	66.7	125
Región										
Atlántica	28.2	5.7	15.9	11.9	2.1	0.0	0.0	6.5	57.9	95
Oriental	26.4	0.0	28.7	10.9	0.0	0.0	0.0	2.4	57.9	62
Central	30.2	11.3	7.7	21.6	0.0	10.0	2.1	0.0	44.1	110
Pacífica	25.2	0.0	8.1	20.4	4.0	13.3	6.4	0.0	43.0	74
Bogotá	12.7	0.0	36.6	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	47
Nivel de urbanización										
Ciudad >700.000 hab	23.0	0.0	13.5	22.2	0.0	3.8	0.0	0.0	56.9	127
Ciudad 50.000-700.000 hab	33.0	8.4	15.7	12.1	0.0	13.0	0.0	7.1	40.1	75
Resto urbano	27.7	9.2	29.6	36.5	3.4	4.4	0.0	0.0	17.0	61
Rural	24.1	5.4	7.9	7.4	2.5	2.5	6.3	1.3	66.7	125
Ocupación del jefe del hogar										
Profesional	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	39.1	0.0	0.0	8
Administrativo	25.2	34.7	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	12
Comerciante	30.6	4.8	34.0	5.1	0.0	0.0	0.0	4.3	47.6	68
Agricultor cta. propia	46.2	0.0	0.0	9.5	0.0	9.5	15.2	0.0	65.9	17
Agrícola asalariado rural	22.3	0.0	12.8	6.3	3.1	0.0	0.0	2.2	75.5	82
Servicios	25.0	5.7	0.0	51.7	5.1	7.8	0.0	0.0	22.6	59
Obrero calificado	29.8	6.7	21.3	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	65.8	48
Obrero no calificado	21.6	8.1	10.1	36.9	0.0	10.6	0.0	4.9	29.3	80
Sin información	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	0.0	0.0	63.1	13
Índice de NBI										
No pobre	23.5	4.9	18.6	6.2	0.0	9.5	0.0	0.0	56.8	93
Pobre	18.5	3.3	15.0	31.7	0.0	5.4	0.0	4.1	40.6	112
En miseria	31.9	6.0	13.8	17.1	2.3	4.5	3.2	2.2	49.1	184
Con quién viven las adolescentes										
Padres	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Propio hogar	25.4	4.5	13.6	17.6	1.4	6.2	2.0	2.3	50.4	371
Otros	52.6	14.5	35.7	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	13
Grupo de edad										
15-17	25.3	0.0	13.4	21.1	0.0	7.0	0.0	0.0	58.5	107
18-19	26.3	7.1	15.7	16.5	1.8	5.3	2.5	2.9	45.6	282
Nivel de educación										
Sin educación	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	78.9	7
Primaria	28.3	5.2	11.0	19.5	0.0	4.2	2.6	0.0	55.4	160
Secundaria	23.6	5.7	19.9	17.6	2.6	7.6	1.3	2.4	40.9	218
Universitaria	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Total	26.0	5.2	15.1	17.7	1.3	5.7	1.9	2.1	49.0	388

Cuadro 7.7.3
 Porcentaje de niños menores de 5 años de edad con diarrea y
 diarrea con sangre durante las dos semanas antes de la encuesta,
 según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Prevalencia de la diarrea	
	Diarrea Prev. 2 semanas	Número de niños
Edad del niño		
Menos de 6 meses	8.6	88
6-11 meses	24.0	87
12-23 meses	23.5	117
24-35 meses	13.9	55
36-37 meses	13.3	28
48-59 meses	15.5	13
Sexo		
Masculino	15.4	203
Femenino	20.6	186
Orden de nacimiento		
1	17.3	330
2-3	22.0	56
4-5	0.0	2
Zona		
Urbana	15.8	263
Rural	22.2	125
Región		
Atlántica	13.6	95
Oriental	22.1	62
Central	21.6	110
Pacífica	18.3	74
Bogotá	11.5	47
Nivel de urbanización		
Ciudad >700.000 hab	18.4	127
Ciudad 50.000-700.000 hab	14.5	75
Resto urbano	12.2	61
Rural	22.2	125
Ocupación del jefe del hogar		
Profesional	0.0	8
Administrativo	13.5	12
Comerciante	12.2	68
Agricultor cta. propia	32.2	17
Agricultor asalariado rural	26.9	82
Servicios	10.7	59
Obrero calificado	15.2	48
Obrero no calificado	20.8	80
Sin información	12.5	13
Índice de NBI		
No pobre	17.0	93
Pobre	12.6	112
En miseria	21.6	184
Con quién viven las adolescentes		
Padres	0.0	4
Propio hogar	18.1	371
Otros	16.0	13
Grupo de edad		
15-17	23.3	107
18-19	15.8	282
Nivel de educación		
Sin educación	25.0	7
Primaria	22.1	160
Secundaria	14.8	218
Universitaria	0.0	3
Total	17.9	388

Cuadro 7.7.4
 Porcentaje de madres con nacimientos en los últimos 5 años que tienen conocimiento de los paquetes de SRO para tratamiento de diarrea, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	% de madres que conocen paquetes SRO	Número de madres
Zona		
Urbana	83.9	230
Rural	69.7	111
Región		
Atlántica	82.8	83
Oriental	75.6	55
Central	78.9	95
Pacífica	77.7	67
Bogotá	80.5	41
Nivel de urbanización		
Ciudad >700.000 hab	87.4	108
Ciudad 50.000-700.000 hab	79.4	67
Resto urbano	82.4	55
Rural	69.7	111
Ocupación del jefe del hogar		
Profesional	100.0	7
Administrativo	92.3	11
Comerciante	83.0	60
Agricultor cta. propia	60.4	15
Agrícola asalariado rural	70.7	71
Servicios	79.9	53
Obrero calificado	77.6	40
Obrero no calificado	82.9	72
Sin información	90.3	13
Índice de NBI		
No pobre	82.3	84
Pobre	90.8	99
En miseria	70.4	158
Con quién viven las adolescentes		
Padres	89.0	6
Propio hogar	78.7	320
Otros	86.6	15
Grupo de edad		
15-17	78.8	98
18-19	79.4	243
Nivel de educación		
Sin educación	30.5	6
Primaria	70.9	136
Secundaria	86.2	197
Universitaria	100.0	3
Total	79.3	341

Cuadro 7.7.5
Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servicio o personal de salud, porcentaje que recibió terapia de rehidratación oral (TRO) y porcentaje que recibió otros tratamientos, según características sociodemográficas. Adolescentes, ENDS-2000

Característica	Servicio de salud	Porcentaje con terapia de rehidratación oral (TRO)					Porcentaje que recibió otros tratamientos		No recibió ningún tratamiento	NS, NR	Niños con diarrea
		Paquete SRO/ Pedialite	SCR en la casa	Alguno SRO o SCR	Incremento líquidos	Total que recibió TRO	Jarabes	Remedio casero otro			
Edad del niño											
Menos de 6 meses	36.6	27.3	10.4	37.7	0.0	37.7	0.0	0.0	62.3	0.0	8
6-11 meses	21.5	25.8	12.7	38.4	9.1	44.0	2.6	35.9	40.6	0.0	21
12-23 meses	17.7	30.0	13.6	37.3	22.8	46.9	11.7	52.2	13.3	1.6	28
24-35 meses	9.8	31.8	33.7	45.6	23.2	56.8	25.0	43.4	20.8	0.0	8
36-37 meses	27.4	20.9	20.9	20.9	79.1	100.0	27.4	24.5	0.0	0.0	4
48-59 meses	0.0	48.0	52.0	100.0	0.0	100.0	52.0	0.0	0.0	0.0	2
Sexo											
Masculino	29.3	31.1	13.3	36.4	13.7	44.5	7.7	47.7	22.7	1.4	31
Femenino	12.4	26.8	19.4	42.2	22.4	55.4	14.0	29.3	29.9	0.0	38
Orden de nacimiento											
1	24.4	28.8	13.7	36.8	22.5	50.1	10.4	41.8	25.7	0.7	57
2-3	0.0	28.2	30.5	52.4	0.0	52.4	15.0	18.1	30.9	0.0	12
Zona											
Urbana	22.1	35.6	21.7	49.4	17.9	62.5	11.3	31.9	23.8	0.0	42
Rural	17.0	18.4	9.1	24.8	19.5	32.4	10.9	46.2	30.9	1.5	28
Región											
Atlántica	16.2	55.4	25.0	68.5	7.5	68.5	4.3	29.2	20.2	0.0	13
Oriental	27.6	6.6	21.7	28.3	27.5	49.2	29.0	49.5	14.2	0.0	14
Central	21.6	27.4	12.0	32.0	24.0	47.9	5.5	41.3	29.2	1.8	24
Pacífica	14.7	32.0	18.7	45.2	17.6	51.9	14.0	33.1	27.9	0.0	14
Bogotá	16.6	18.2	0.0	18.2	0.0	18.2	0.0	22.5	59.4	0.0	5
Nivel de urbanización											
Ciudad >700.000 hab	16.3	49.6	10.0	52.9	4.2	52.9	0.0	36.3	27.0	0.0	23
Ciudad 50.000-700.000 hab	17.2	9.2	55.1	55.1	37.0	82.9	27.4	27.8	17.1	0.0	11
Resto urbano	47.1	30.0	10.1	30.0	32.9	62.9	23.5	23.6	23.6	0.0	7
Rural	17.0	18.4	9.1	24.8	19.5	32.4	10.9	46.2	30.9	1.5	28
Ocupación jefe del hogar											
Administrativo	33.3	33.3	66.7	100.0	0.0	100.0	33.3	33.3	0.0	0.0	2
Comerciante	10.3	45.3	21.1	66.4	25.5	80.3	0.0	47.1	10.9	0.0	8
Agricultor cta. propia	16.4	16.4	13.4	29.8	29.8	29.8	14.4	16.4	55.8	0.0	6
Agrícola asalariado rural	15.2	13.5	8.2	18.3	13.8	27.9	7.7	48.7	29.4	1.9	22
Servicios	27.5	35.5	11.9	35.5	11.9	35.5	0.0	38.1	49.4	0.0	6
Obrero calificado	27.5	37.6	53.1	66.5	33.5	86.2	28.9	27.5	0.0	0.0	7
Obrero no calificado	22.4	40.4	4.6	40.4	17.1	57.5	15.6	28.7	29.5	0.0	17
Sin información	48.6	0.0	48.6	48.6	0.0	48.6	0.0	51.4	0.0	0.0	2
Índice de NBI											
No pobre	5.7	17.8	7.0	24.8	12.8	37.6	5.5	46.9	31.8	2.7	16
Pobre	44.9	26.5	13.3	32.7	20.8	46.3	12.8	51.5	21.7	0.0	14
En miseria	17.0	33.8	21.7	47.9	20.0	57.1	12.8	29.1	26.3	0.0	40
Con quién viven las adolescentes											
Propio hogar	20.7	29.6	17.2	40.8	17.8	50.8	10.2	35.7	27.5	0.6	67
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	40.7	40.7	100.0	0.0	0.0	2
Grupo de edad											
15-17	29.7	24.1	9.7	30.7	15.6	42.7	15.5	39.9	30.9	0.0	25
18-19	14.7	31.3	20.6	44.5	20.2	54.8	8.8	36.3	24.3	1.0	45
Nivel de educación											
Sin educación	0.0	0.0	49.6	49.6	0.0	49.6	0.0	0.0	50.4	0.0	2
Primaria	18.4	25.0	17.5	36.0	19.9	51.3	16.7	38.9	22.6	1.2	35
Secundaria	23.0	34.4	14.0	42.9	18.0	49.6	5.7	38.3	29.7	0.0	32
Total	20.0	28.7	16.7	39.6	18.5	50.5	11.2	37.6	26.6	0.6	69