

CAPITULO X

OTROS ASPECTOS DE LA SALUD FEMENINA

La EPDS-90 averiguó sobre dos aspectos importantes de la salud femenina: el conocimiento y la práctica de la citología vaginal y el conocimiento sobre el SIDA y sus formas de prevención.

10.1 CITOLOGIA VAGINAL

El aumento del cáncer del útero ha inquietado a la comunidad médica de todo el mundo, por lo cual cada vez adquieren mayor importancia los exámenes de citología vaginal, los cuales tienen por objeto detectar precozmente este tipo de malformaciones. De allí el interés por conocer qué tanto está informada la población femenina sobre la posibilidad de diagnóstico y de prevención, y si se han practicado o no dicho examen.

10.1.1 Nivel de Conocimiento

Del total de mujeres en edad fértil, solamente 66 por ciento sabe lo que es una citología vaginal (cuadro 10.1). El conocimiento es mayor entre la población urbana (70 por ciento) que entre la rural (53 por ciento). En las subregiones de Bogotá, Valle, Antioquia y el Antiguo Caldas las proporciones de mujeres que conocen la citología vaginal pasan del 72 por ciento, mientras que en ciertas subregiones (Boyacá-Cundinamarca-Meta, Bolívar-Sucre-Córdoba, Guajira-Cesar-Magdalena, Tolima-Huila-Caquetá y Chocó-Cauca-Nariño), el conocimiento apenas lo tiene un poco más de la mitad de las mujeres.

10.1.2 Práctica de la Citología

Los niveles de práctica de la citología vaginal también se presentan en el cuadro 10.1. La proporción de mujeres que se ha practicado una citología vaginal es del 46 por ciento, siendo muy baja la proporción entre las mujeres menores de 25 años. Pero ya entre las mujeres 25-29 la proporción de mujeres que ha tenido citologías llega al 53 por ciento y en entre el resto de mujeres es cercana al 80 por ciento. El 23 por ciento de las mujeres han tenido 5 citologías o más. La edad es también un determinante básico del número de citologías, mostrando las mayores de 30 años los porcentajes más altos entre las que se la han hecho cinco y más veces. La práctica es más alta en las subregiones de Bogotá, Antioquia, Valle, Antiguo Caldas y los Santanderes.

10.1.3 Frecuencia de la Práctica de la Citología

El cuadro 10.2 presenta información sobre el número de veces que las mujeres se han hecho citología vaginal. La tercera parte de las mujeres, 35 por ciento, se ha mandado a hacer la prueba una vez al año y el 16 por ciento hasta dos veces al año; el 14 por ciento la han tenido más espaciada y 16 por ciento se la han hecho solamente cuando se les ha prescrito.

Las más jóvenes se la han hecho solamente siguiendo prescripción, en tanto que las mayores de 25 se la han hecho por lo menos una vez al año. La frecuencia anual o mayor depende del nivel educativo de las mujeres, siendo las más educadas las que más se la han practicado.

10.1.4 Lugar de la Última Citología

En el 31 por ciento de los casos las entrevistadas mencionan los hospitales o clínicas como el primer lugar donde se practican citologías; en segundo lugar los médicos particulares con 16 por ciento; y los sistemas de seguridad social como el Instituto de Seguros Sociales y la Caja Nacional de Previsión Social fueron mencionados en el 12 por ciento de los casos (cuadro 10.3). PROFAMILIA y la Liga contra el Cáncer atienden el 11 y el 10 por ciento de las citologías, respectivamente. Casi una quinta parte de las mujeres (19 por ciento) mencionan otra institución como el sitio de la citología.

Las usuarias de PROFAMILIA y del ISS o CAJANAL son, principalmente, mujeres entre los 25 y los 39 años, en tanto que las de la Liga contra el Cáncer se sitúan más entre los 35 y los 44 años. Las usuarias de los hospitales, por otra parte, son mujeres menores de 25 o mayores de 40 años y, además, de menor educación. Quienes más recurren a médicos particulares para la citología son, ante todo, mujeres con secundaria o más, lo mismo que las que van al Seguro Social o a la Caja Nacional. La Liga contra el Cáncer atiende más a personas con primaria o secundaria, en tanto que las usuarias de PROFAMILIA son, en buena parte, mujeres con educación secundaria.

Las regiones Atlántica y Oriental están atendidas especialmente por la Liga y el ISS; la región Central por PROFAMILIA y los hospitales; la Pacífica por los hospitales y los médicos particulares; en Bogotá es muy importante PROFAMILIA, el Seguro Social y los médicos particulares.

Del total de mujeres que dicen haberse hecho la última citología en PROFAMILIA, 9 por ciento pertenecen a la región Atlántica, 12 por ciento a la Oriental, 32 por ciento a la región Central, 15 por ciento a la del Pacífica y 32 por ciento a Bogotá. Estos porcentajes se pueden comparar con la distribución que presentaban las usuarias de citología en 1989: 9 por ciento pertenecían a la región Atlántica; 9 por ciento a la Oriental; 38 por ciento a la Central; 19 por ciento a la Pacífica y 26 por ciento a Bogotá.¹⁶

10.2 SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)

Con el fin de saber el grado de conocimiento que las mujeres tienen sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, sus formas de contagio y de prevención, se indagó a todas las mujeres entrevistada en la EPDS-90 sobre este tema.

10.2.1 Niveles de Conocimiento sobre el SIDA

Los niveles de conocimiento del SIDA en general y las formas de contagio se presentan en el cuadro 10.4. La proporción de mujeres que ha oído hablar del SIDA es alta, 97 por ciento, siendo de 98 por ciento en la zona urbana y de 92 en la zona rural. Las subregiones con el mayor conocimiento son Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia y los Santanderes. Donde menos se ha oído hablar del tema es en Chocó-Cauca-Nariño. Entre mayor sea la educación, mayor el conocimiento; en cambio, no parece haber ninguna correlación con la edad de las mujeres.

10.2.2 Formas de Adquirir el SIDA

Como formas de adquirir el SIDA se mencionan, en primer lugar, con 77 por ciento, las relaciones heterosexuales; las transfusiones de sangre (32 por ciento); las inyecciones con jeringas usadas

¹⁶Profamilia. *Informe de Actividades de Servicio 1989*.

(17 por ciento); y en cuarto lugar, con 12 por ciento, las relaciones homosexuales. Otras formas de posible contagio como los besos y caricias, compartir jeringas, la lactancia por parte de madres infectadas y el sexo oral, fueron mencionadas por menos del tres por ciento de las mujeres.

De nuevo, las mujeres de las subregiones en donde más se conoce el SIDA mencionan más todas las formas de contagio. Asimismo, las mujeres entre los 25 y los 39 años parecen conocer mejor el problema, lo mismo que las más educadas, es decir, aquellas que tienen educación secundaria o más.

10.2.3 Grupos más Expuestos al SIDA

Del total de mujeres que conoce sobre el SIDA, 39 por ciento dicen que cualquier persona puede ser afectada por la enfermedad; 25 por ciento piensa que solo se pueden afectar los homosexuales; 21 por ciento piensan que cualquier hombre y 18 por ciento que cualquier mujer puede contraer la enfermedad (véase el cuadro 10.5). El 13 por ciento de las mujeres mencionan las prostitutas como uno de los grupos más expuestos y apenas el 4 por ciento a los niños.

De nuevo, parece haber mayor conocimiento sobre los grupos de mayor riesgo en las subregiones o grupos poblacionales de mayor desarrollo. Además, entre más alta sea la educación, más se mencionan todas las personas y los homosexuales, las prostitutas, los niños y los drogadictos, en tanto que las menos educadas, en forma tímida, mencionan que cualquier hombre o cualquier mujer está expuesto.

10.2.4 Formas de Prevención del SIDA

En la EPDS-90 también se preguntó sobre formas de prevenir el SIDA. Los resultados se consignan en el cuadro 10.6: del 75 por ciento de las mujeres que piensan que el SIDA se puede prevenir, 64 por ciento mencionan la fidelidad como el mejor medio de prevenirla, 35 por ciento el uso de condones, 14 por ciento evitando las transfusiones de sangre y otro 14 por ciento dice que no compartiendo jeringas usadas. El evitar las relaciones homosexuales, transfusiones, relaciones anales y el sexo fueron mencionados por menos del 5 por ciento en cada caso.

En las subregiones de Bogotá, Valle, Atlántico, Antioquia y el Viejo Caldas existe mayor conocimiento sobre las formas de prevención del SIDA. En Bogotá, Valle y el Antiguo Caldas es donde más se menciona el uso de condones; en Atlántico, Antioquia, Cundinamarca-Boyacá y Valle se dice que la fidelidad es importante; en Bogotá, Valle y los Santanderes el evitar transfusiones de sangre se menciona más que en las demás subregiones y en Bogotá, Atlántico y los Santanderes, el evitar compartir jeringas. Entre mayor sea la educación más se mencionan las cuatro primeras formas de prevención.

CUADRO 10.1 PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONOCE CITOLOGIA, PORCENTAJE QUE HA TENIDO Y NUMERO DE VECES QUE LA HAN TENIDO, SEGUN EDAD, LUGAR DE RESIDENCIA Y NIVEL EDUCATIVO. EPDS, 1990

| Características | Conoce citología | Ha tenido citologías | Entre las que han tenido, número de veces | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | Una vez | Dos veces | Tres veces | Cuatro veces | Cinco a diez veces | Diez o más veces | No recuerda |
| EDAD | | | | | | | | | |
| 15-19 | 31.5 | 4.4 | 75.3 | 13.6 | 6.5 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 20-24 | 58.9 | 28.8 | 42.4 | 26.6 | 12.2 | 6.7 | 8.4 | 0.3 | 3.3 |
| 25-29 | 75.1 | 52.8 | 25.9 | 21.6 | 18.4 | 12.3 | 17.3 | 1.2 | 3.3 |
| 30-34 | 81.5 | 70.0 | 16.8 | 17.2 | 14.5 | 10.5 | 26.8 | 6.4 | 7.6 |
| 35-39 | 84.6 | 74.9 | 13.4 | 13.5 | 10.9 | 10.2 | 27.0 | 12.7 | 12.3 |
| 40-44 | 85.3 | 78.3 | 9.5 | 14.6 | 16.3 | 9.2 | 23.4 | 13.1 | 13.7 |
| 45-49 | 76.8 | 67.8 | 11.2 | 14.4 | 11.4 | 7.5 | 33.5 | 10.4 | 11.4 |
| ZONA | | | | | | | | | |
| Urbana | 70.1 | 48.5 | 19.0 | 16.8 | 12.3 | 9.7 | 23.1 | 8.5 | 10.3 |
| Rural | 53.1 | 39.4 | 23.7 | 19.6 | 17.6 | 9.4 | 21.2 | 4.3 | 4.3 |
| REGION | | | | | | | | | |
| Atlántica | 55.5 | 39.4 | 26.3 | 19.9 | 13.7 | 9.2 | 23.8 | 4.4 | 2.3 |
| Oriental | 57.2 | 42.4 | 22.0 | 19.1 | 13.5 | 11.3 | 23.0 | 4.5 | 6.4 |
| Central | 70.1 | 48.7 | 21.3 | 16.1 | 13.4 | 9.6 | 24.5 | 9.9 | 5.0 |
| Pacífica | 67.1 | 45.6 | 15.5 | 19.4 | 16.2 | 7.7 | 17.3 | 4.4 | 19.4 |
| Bogotá | 77.2 | 54.0 | 18.1 | 15.9 | 14.0 | 10.3 | 22.5 | 9.6 | 9.6 |
| SUBREGION | | | | | | | | | |
| Subregión 1 | 54.3 | 38.2 | 25.3 | 24.4 | 13.1 | 9.7 | 21.2 | 3.8 | 2.0 |
| Subregión 2 | 62.1 | 40.3 | 27.7 | 15.9 | 10.3 | 9.2 | 30.0 | 5.0 | 1.7 |
| Subregión 3 | 52.0 | 39.6 | 26.0 | 19.6 | 16.3 | 9.0 | 21.3 | 4.5 | 2.8 |
| Subregión 4 | 63.5 | 47.2 | 19.9 | 17.9 | 11.1 | 14.6 | 19.0 | 6.8 | 10.4 |
| Subregión 5 | 51.7 | 38.2 | 24.2 | 20.4 | 16.0 | 7.6 | 27.5 | 2.0 | 2.1 |
| Subregión 6 | 73.6 | 51.3 | 21.8 | 15.1 | 9.8 | 11.7 | 24.2 | 10.6 | 6.6 |
| Subregión 7 | 72.4 | 49.6 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 8.3 | 27.5 | 9.9 | 1.9 |
| Subregión 8 | 57.7 | 40.6 | 23.3 | 17.7 | 21.4 | 4.0 | 21.6 | 7.7 | 4.2 |
| Subregión 9 | 54.6 | 36.7 | 18.5 | 23.4 | 23.3 | 5.8 | 16.4 | 1.3 | 11.2 |
| Subregión 10 | 74.0 | 50.5 | 14.3 | 17.9 | 13.4 | 8.4 | 17.7 | 5.6 | 22.7 |
| Subregión 11 | 77.2 | 54.0 | 18.1 | 15.9 | 14.0 | 10.3 | 22.5 | 9.6 | 9.6 |
| Subregión 12 | 80.4 | 58.4 | 23.3 | 14.8 | 9.1 | 10.2 | 23.4 | 11.8 | 7.0 |
| Subregión 13 | 78.0 | 58.6 | 14.5 | 13.0 | 9.3 | 8.0 | 27.9 | 7.9 | 19.4 |
| NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | | | |
| Sin educación | 46.5 | 39.7 | 20.9 | 19.7 | 13.3 | 8.3 | 19.6 | 4.5 | 13.7 |
| Primaria | 57.5 | 47.7 | 21.1 | 20.1 | 16.8 | 9.0 | 20.4 | 5.7 | 6.6 |
| Secundaria | 69.4 | 43.9 | 21.3 | 16.9 | 11.9 | 10.4 | 23.3 | 8.5 | 7.6 |
| Superior | 92.8 | 56.0 | 15.6 | 11.5 | 12.5 | 8.9 | 28.1 | 7.8 | 15.3 |
| TOTAL | 65.9 | 46.2 | 20.6 | 17.8 | 14.1 | 9.6 | 22.5 | 7.1 | 8.3 |

CUADRO 10.2 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES QUE HAN TENIDO CITOLOGIAS POR FRECUENCIA CON QUE SE LA PRACTICAN, SEGUN EDAD, LUGAR DE RESIDENCIA Y NIVEL EDUCATIVO. EPDS, 1990

| Características | Una vez al año | Dos veces al año | Mas espaciada | Cuando le mandan | Solo una vez | No recuerda | Total |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| EDAD | | | | | | | |
| 15-19 | 19.8 | 5.3 | 0.0 | 19.8 | 54.9 | 0.0 | 100.0 |
| 20-24 | 22.4 | 17.3 | 6.8 | 19.4 | 33.7 | 0.2 | 100.0 |
| 25-29 | 34.5 | 14.8 | 13.7 | 14.8 | 21.9 | 0.0 | 100.0 |
| 30-34 | 35.5 | 20.6 | 12.6 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 100.0 |
| 35-39 | 40.7 | 16.9 | 16.5 | 12.2 | 13.2 | 0.2 | 100.0 |
| 40-44 | 34.5 | 16.2 | 19.9 | 17.6 | 11.1 | 0.5 | 100.0 |
| 45-49 | 38.7 | 9.1 | 18.2 | 21.4 | 10.9 | 1.4 | 100.0 |
| ZONA | | | | | | | |
| Urbana | 35.8 | 17.6 | 13.9 | 16.6 | 15.4 | 0.5 | 100.0 |
| Rural | 32.3 | 13.2 | 15.0 | 15.8 | 23.5 | 0.0 | 100.0 |
| REGION | | | | | | | |
| Atlántica | 30.2 | 17.6 | 14.7 | 13.6 | 23.5 | 0.2 | 100.0 |
| Oriental | 37.9 | 16.5 | 16.9 | 8.1 | 20.3 | 0.1 | 100.0 |
| Central | 30.9 | 13.1 | 17.9 | 16.6 | 21.2 | 0.0 | 100.0 |
| Pacífica | 33.8 | 20.0 | 7.2 | 25.0 | 12.8 | 0.9 | 100.0 |
| Bogotá | 41.5 | 15.5 | 12.9 | 16.9 | 12.4 | 0.6 | 100.0 |
| SUBREGION | | | | | | | |
| Subregión 1 | 35.4 | 16.7 | 9.1 | 21.5 | 17.0 | 0.1 | 100.0 |
| Subregión 2 | 30.5 | 19.0 | 11.9 | 12.3 | 25.9 | 0.2 | 100.0 |
| Subregión 3 | 26.9 | 17.2 | 20.0 | 9.5 | 26.0 | 0.2 | 100.0 |
| Subregión 4 | 40.2 | 16.8 | 16.5 | 7.2 | 18.9 | 0.2 | 100.0 |
| Subregión 5 | 35.3 | 16.2 | 17.3 | 9.1 | 21.9 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 6 | 31.3 | 14.4 | 19.1 | 13.1 | 21.8 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 7 | 33.0 | 11.0 | 17.9 | 22.3 | 15.5 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 8 | 26.9 | 11.4 | 13.7 | 20.4 | 27.4 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 9 | 29.8 | 9.1 | 9.7 | 27.4 | 23.6 | 0.1 | 100.0 |
| Subregión 10 | 35.5 | 24.5 | 6.2 | 23.9 | 8.3 | 1.3 | 100.0 |
| Subregión 11 | 41.5 | 15.5 | 12.9 | 16.9 | 12.4 | 0.6 | 100.0 |
| Subregión 12 | 29.2 | 14.6 | 21.6 | 11.5 | 22.8 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 13 | 37.3 | 26.2 | 7.0 | 19.3 | 9.8 | 0.2 | 100.0 |
| NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | |
| Sin educación | 23.9 | 9.3 | 13.7 | 20.8 | 27.9 | 4.2 | 100.0 |
| Primaria | 30.3 | 14.1 | 16.3 | 19.6 | 19.3 | 0.1 | 100.0 |
| Secundaria | 37.2 | 17.2 | 13.1 | 14.2 | 17.9 | 0.1 | 100.0 |
| Superior | 44.2 | 22.0 | 11.3 | 9.9 | 11.9 | 0.4 | 100.0 |
| TOTAL | 34.6 | 16.1 | 14.3 | 16.3 | 18.2 | 0.3 | 100.0 |

CUADRO 10.3 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES POR SITIOS DONDE ACUDEN AL SERVICIO DE CITOLOGIA, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS. EPDS, 1990

| Características | PROFA- MILIA | Liga Contra el Cancer | Médico particular | CAJANAL, ISS, otra | Hospital/ Clínica | Otro sitio | No recuerda | Total |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|
| EDAD | | | | | | | | |
| 15-19 | 6.0 | 1.8 | 12.6 | 5.5 | 42.7 | 23.7 | 7.3 | 100.0 |
| 20-24 | 8.9 | 8.2 | 17.8 | 8.1 | 35.9 | 20.2 | 0.6 | 100.0 |
| 25-29 | 13.5 | 9.3 | 15.4 | 12.6 | 30.1 | 18.3 | 0.4 | 100.0 |
| 30-34 | 13.0 | 9.7 | 14.8 | 13.2 | 29.2 | 19.8 | 0.1 | 100.0 |
| 35-39 | 13.0 | 11.3 | 20.5 | 15.9 | 21.8 | 16.9 | 0.3 | 100.0 |
| 40-44 | 7.2 | 14.0 | 16.0 | 10.7 | 30.9 | 20.6 | 0.3 | 100.0 |
| 45-49 | 9.6 | 8.4 | 12.4 | 9.2 | 40.3 | 18.5 | 1.2 | 100.0 |
| ZONA | | | | | | | | |
| Urbana | 13.1 | 11.6 | 18.6 | 15.2 | 24.4 | 16.3 | 0.5 | 100.0 |
| Rural | 7.6 | 7.0 | 11.7 | 5.7 | 42.6 | 24.4 | 0.7 | 100.0 |
| REGION | | | | | | | | |
| Atlántica | 5.9 | 21.2 | 13.7 | 13.0 | 26.9 | 18.7 | 0.3 | 100.0 |
| Oriental | 8.5 | 12.9 | 16.1 | 12.0 | 25.5 | 22.8 | 1.9 | 100.0 |
| Central | 12.1 | 5.1 | 13.9 | 9.0 | 37.5 | 21.8 | 0.3 | 100.0 |
| Pacífica | 9.3 | 5.3 | 19.4 | 9.8 | 37.1 | 18.8 | 0.0 | 100.0 |
| Bogotá | 18.3 | 9.9 | 19.0 | 17.4 | 21.9 | 12.5 | 0.7 | 100.0 |
| SUBREGION | | | | | | | | |
| Subregión 1 | 8.5 | 22.4 | 9.5 | 13.4 | 26.9 | 18.9 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 2 | 3.9 | 12.2 | 12.5 | 16.7 | 38.1 | 15.8 | 0.6 | 100.0 |
| Subregión 3 | 5.5 | 26.4 | 17.1 | 10.3 | 19.7 | 20.4 | 0.2 | 100.0 |
| Subregión 4 | 8.2 | 14.3 | 20.2 | 12.0 | 18.2 | 24.7 | 2.1 | 100.0 |
| Subregión 5 | 8.9 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 33.5 | 20.8 | 1.6 | 100.0 |
| Subregión 6 | 15.6 | 0.7 | 18.3 | 10.3 | 33.8 | 20.4 | 0.6 | 100.0 |
| Subregión 7 | 8.3 | 14.9 | 7.2 | 7.6 | 38.3 | 23.5 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 8 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 6.7 | 48.6 | 24.3 | 0.1 | 100.0 |
| Subregión 9 | 5.5 | 0.8 | 13.1 | 11.0 | 45.7 | 23.6 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 10 | 10.9 | 7.2 | 22.1 | 9.3 | 33.5 | 16.8 | 0.0 | 100.0 |
| Subregión 11 | 18.3 | 9.9 | 19.0 | 17.4 | 21.9 | 12.5 | 0.7 | 100.0 |
| Subregión 12 | 20.8 | 0.6 | 21.1 | 13.3 | 20.1 | 22.9 | 0.9 | 100.0 |
| Subregión 13 | 11.3 | 7.4 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 27.2 | 0.0 | 100.0 |
| NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | | |
| Sin educación | 5.6 | 7.7 | 5.4 | 7.2 | 43.6 | 26.9 | 3.3 | 100.0 |
| Primaria | 10.0 | 10.7 | 8.6 | 7.6 | 38.2 | 24.1 | 0.5 | 100.0 |
| Secundaria | 13.4 | 10.2 | 18.0 | 15.2 | 27.0 | 15.5 | 0.5 | 100.0 |
| Superior | 9.4 | 7.6 | 42.3 | 18.0 | 11.3 | 10.7 | 0.4 | 100.0 |
| TOTAL | 11.2 | 10.0 | 16.2 | 12.0 | 30.6 | 19.1 | 0.6 | 100.0 |

CUADRO 10.4 PORCENTAJE DE MUJERES CON CONOCIMIENTO DEL SIDA Y PORCENTAJE QUE CONOCE FORMAS ESPECIFICAS DE CONTAGIO, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS. EPDS, 1990

| Características | Formas específicas de contagio conocidas | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| | Conoce SIDA | Relaciones heterosexuales | Comparación con tir jeringa | Inyección con jeringa usada | Transfusión sanguínea | Lactancia | Masajes/ caricias | Sexo oral | Relaciones homosexuales | Beso | Otras formas |
| EDAD | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 97.2 | 76.1 | 2.3 | 17.4 | 31.2 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 13.4 | 6.7 | 12.7 |
| 20-24 | 94.5 | 78.9 | 2.9 | 18.7 | 32.9 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 12.4 | 5.6 | 15.3 |
| 25-29 | 98.3 | 80.2 | 2.6 | 14.7 | 33.2 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 13.4 | 7.6 | 12.5 |
| 30-34 | 97.0 | 81.1 | 4.2 | 17.8 | 34.2 | 2.4 | 0.2 | 1.0 | 12.8 | 6.4 | 14.2 |
| 35-39 | 97.0 | 78.8 | 3.8 | 17.4 | 33.6 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 11.4 | 6.8 | 13.6 |
| 40-44 | 96.6 | 73.9 | 2.5 | 17.7 | 26.0 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 9.8 | 8.4 | 13.6 |
| 45-49 | 95.4 | 66.0 | 1.3 | 13.1 | 25.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 10.9 | 8.6 | 13.2 |
| ZONA | | | | | | | | | | | |
| Urbana | 98.1 | 84.4 | 3.9 | 20.4 | 40.5 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 14.3 | 6.5 | 12.5 |
| Rural | 92.4 | 66.3 | 1.1 | 11.4 | 17.5 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 9.4 | 7.6 | 15.4 |
| REGION | | | | | | | | | | | |
| Atlántica | 96.9 | 75.1 | 1.8 | 15.1 | 26.6 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 8.8 | 6.2 | 14.1 |
| Oriental | 95.3 | 70.2 | 1.3 | 17.1 | 25.5 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 7.0 | 5.5 | 19.7 |
| Central | 96.2 | 79.2 | 1.5 | 13.7 | 29.0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 14.5 | 9.4 | 13.3 |
| Pacífica | 95.7 | 77.4 | 3.7 | 15.7 | 30.7 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 13.4 | 5.4 | 9.5 |
| Bogotá | 99.1 | 84.2 | 6.8 | 25.1 | 48.1 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 17.3 | 6.6 | 11.8 |
| SUBREGION | | | | | | | | | | | |
| Subregión 1 | 95.6 | 75.3 | 2.0 | 11.7 | 22.4 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 8.9 | 4.8 | 13.7 |
| Subregión 2 | 99.1 | 86.4 | 2.5 | 21.7 | 38.0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 9.6 | 6.8 | 14.2 |
| Subregión 3 | 96.4 | 67.6 | 1.3 | 13.0 | 21.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 8.1 | 6.9 | 14.2 |
| Subregión 4 | 97.9 | 74.0 | 1.6 | 18.3 | 30.6 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 7.1 | 6.3 | 19.2 |
| Subregión 5 | 93.0 | 66.6 | 0.9 | 16.0 | 20.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.7 | 20.1 |
| Subregión 6 | 95.2 | 84.3 | 1.6 | 15.3 | 33.4 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 16.1 | 11.2 | 14.1 |
| Subregión 7 | 98.7 | 82.2 | 1.3 | 10.8 | 26.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 15.4 | 7.6 | 9.8 |
| Subregión 8 | 96.0 | 61.4 | 1.2 | 12.6 | 20.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | 6.5 | 15.6 |
| Subregión 9 | 88.7 | 75.1 | 1.7 | 9.6 | 12.9 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 6.1 | 5.3 | 8.3 |
| Subregión 10 | 99.5 | 78.5 | 4.7 | 18.6 | 39.5 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 17.0 | 5.5 | 10.1 |
| Subregión 11 | 99.1 | 84.2 | 6.8 | 25.1 | 48.1 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | 17.3 | 6.6 | 11.8 |
| Subregión 12 | 97.0 | 88.1 | 1.4 | 16.7 | 38.2 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 19.0 | 7.3 | 11.9 |
| Subregión 13 | 99.1 | 87.2 | 4.8 | 15.6 | 35.1 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 12.3 | 6.5 | 7.1 |
| NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | | | | | |
| Sin educación | 84.1 | 44.8 | 1.3 | 4.9 | 6.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 5.1 | 15.0 |
| Primaria | 94.1 | 64.6 | 1.2 | 9.4 | 15.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 9.1 | 6.7 | 13.3 |
| Secundaria | 99.3 | 87.6 | 3.4 | 21.2 | 39.9 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 14.8 | 7.9 | 13.8 |
| Superior | 100.0 | 93.6 | 7.9 | 31.9 | 66.7 | 6.4 | 1.1 | 1.9 | 17.0 | 3.7 | 13.6 |
| TOTAL | 96.6 | 77.4 | 2.8 | 16.9 | 31.6 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 12.4 | 6.9 | 13.6 |

CUADRO 10.5 PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONOCEN EL SIDA QUE CONSIDERAN GRUPOS ESPECIFICOS COMO LOS MAS EXPUESTOS AL RIESGO DE CONTRAER EL SIDA, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS. EPDS, 1990

| Características | Homo- sexuales | Prosti- tutas | Cualquier hombre | Cualquier mujer | Nifios | Droga- dictos | Todos | No Sabe | Mujeres que conocen SIDA |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| EDAD | | | | | | | | | |
| 15-19 | 25.8 | 15.6 | 19.8 | 18.5 | 3.5 | 1.6 | 36.8 | 18.8 | 1729 |
| 20-24 | 27.4 | 13.7 | 22.9 | 19.9 | 4.3 | 1.8 | 36.1 | 16.5 | 1589 |
| 25-29 | 23.0 | 13.4 | 21.5 | 18.1 | 2.4 | 1.5 | 42.7 | 15.0 | 1442 |
| 30-34 | 24.8 | 11.1 | 19.6 | 17.1 | 4.2 | 1.6 | 43.5 | 16.0 | 1158 |
| 35-39 | 26.6 | 13.9 | 20.3 | 17.8 | 3.2 | 2.2 | 41.9 | 14.4 | 926 |
| 40-44 | 24.3 | 10.4 | 20.4 | 18.9 | 2.6 | 1.7 | 39.1 | 17.3 | 712 |
| 45-49 | 25.0 | 11.6 | 25.6 | 18.1 | 3.6 | 0.6 | 29.0 | 22.9 | 641 |
| ZONA | | | | | | | | | |
| Urbana | 29.1 | 13.3 | 19.5 | 17.3 | 3.8 | 2.0 | 46.1 | 10.6 | 6191 |
| Rural | 19.5 | 13.3 | 24.0 | 20.3 | 2.9 | 0.9 | 27.2 | 27.1 | 2007 |
| REGION | | | | | | | | | |
| Atlántica | 25.7 | 22.6 | 30.8 | 24.5 | 4.8 | 1.6 | 21.1 | 24.9 | 1588 |
| Oriental | 24.1 | 11.4 | 16.9 | 12.6 | 1.9 | 1.7 | 34.6 | 24.3 | 1411 |
| Central | 23.1 | 11.6 | 26.8 | 25.3 | 3.5 | 0.8 | 40.1 | 12.7 | 2282 |
| Pacífica | 29.3 | 9.8 | 15.2 | 12.9 | 2.3 | 1.7 | 42.3 | 16.0 | 1470 |
| Bogotá | 26.0 | 11.0 | 12.4 | 12.5 | 4.5 | 2.7 | 56.8 | 9.0 | 1447 |
| SUBREGION | | | | | | | | | |
| Subregión 1 | 20.4 | 23.0 | 32.6 | 23.1 | 4.8 | 0.8 | 22.9 | 21.8 | 448 |
| Subregión 2 | 31.5 | 25.1 | 33.1 | 24.4 | 5.0 | 2.2 | 26.5 | 16.5 | 452 |
| Subregión 3 | 25.4 | 20.7 | 28.0 | 25.4 | 4.8 | 1.6 | 16.3 | 32.3 | 686 |
| Subregión 4 | 27.4 | 13.1 | 19.0 | 12.2 | 1.3 | 1.7 | 36.0 | 21.4 | 682 |
| Subregión 5 | 20.9 | 9.8 | 14.9 | 12.8 | 2.5 | 1.7 | 33.2 | 27.0 | 729 |
| Subregión 6 | 22.8 | 11.3 | 33.4 | 32.4 | 2.9 | 0.8 | 40.4 | 8.0 | 1260 |
| Subregión 7 | 25.8 | 10.4 | 17.8 | 15.5 | 4.9 | 1.2 | 44.9 | 13.6 | 561 |
| Subregión 8 | 20.5 | 14.1 | 19.9 | 17.8 | 3.5 | 0.6 | 33.5 | 24.2 | 461 |
| Subregión 9 | 20.1 | 14.6 | 21.6 | 18.7 | 3.3 | 0.9 | 29.0 | 26.6 | 482 |
| Subregión 10 | 33.8 | 7.4 | 12.1 | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 48.8 | 10.8 | 987 |
| Subregión 11 | 26.0 | 11.0 | 12.4 | 12.5 | 4.5 | 2.7 | 56.8 | 9.0 | 1447 |
| Subregión 12 | 25.2 | 10.2 | 31.7 | 30.9 | 3.2 | 0.4 | 45.7 | 4.6 | 691 |
| Subregión 13 | 30.9 | 8.6 | 14.9 | 14.1 | 2.8 | 2.1 | 50.2 | 8.3 | 352 |
| NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | | | |
| Sin educación | 8.1 | 11.7 | 31.5 | 21.9 | 3.2 | 0.4 | 19.4 | 38.0 | 299 |
| Primaria | 22.3 | 12.5 | 22.9 | 20.1 | 2.3 | 0.8 | 23.2 | 29.8 | 3294 |
| Secundaria | 29.9 | 15.0 | 20.9 | 18.2 | 4.3 | 1.8 | 46.6 | 7.4 | 3801 |
| Superior | 23.1 | 8.3 | 12.1 | 11.3 | 4.3 | 4.4 | 73.4 | 1.8 | 799 |
| TOTAL | 25.4 | 13.3 | 21.2 | 18.4 | 3.5 | 1.6 | 38.8 | 17.0 | 8199 |

CUADRO 10.6 PORCENTAJE DE MUJERES CON CONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE PREVENCIÓN DEL SIDA, SEGUN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS. EPDS, 1990

| Características | Porcentaje conoce que se puede prevenir | Porcentaje que conoce formas específicas de prevención | | | | | | | Otros |
|------------------------|---|--|-------------|------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| | | Usando condones | Fidelidad | Evitando relaciones sexuales | Abstinencia | Evitando transfusión | No com-partiendo jeringa | Evitando relaciones anales | |
| EDAD | | | | | | | | | |
| 15-19 | 72.1 | 32.7 | 59.1 | 6.1 | 3.3 | 15.1 | 12.9 | 0.8 | 15.7 |
| 20-24 | 71.9 | 35.7 | 64.1 | 5.0 | 2.6 | 14.7 | 15.1 | 1.7 | 15.0 |
| 25-29 | 80.0 | 38.0 | 65.3 | 5.0 | 2.3 | 12.2 | 14.2 | 0.9 | 14.9 |
| 30-34 | 79.1 | 35.3 | 67.6 | 5.8 | 2.2 | 16.4 | 16.8 | 1.6 | 16.1 |
| 35-39 | 79.0 | 35.4 | 67.3 | 3.8 | 2.0 | 17.3 | 15.2 | 1.1 | 15.3 |
| 40-44 | 75.2 | 38.3 | 63.5 | 5.6 | 2.5 | 14.0 | 11.3 | 2.2 | 17.1 |
| 45-49 | 70.8 | 25.2 | 56.4 | 5.1 | 2.9 | 9.6 | 11.3 | 0.8 | 16.6 |
| ZONA | | | | | | | | | |
| Urbana | 80.2 | 39.8 | 66.2 | 6.1 | 2.4 | 18.2 | 16.1 | 1.6 | 16.0 |
| Rural | 61.2 | 25.5 | 58.6 | 3.6 | 2.9 | 7.2 | 10.4 | 0.6 | 14.8 |
| REGION | | | | | | | | | |
| Atlántica | 70.7 | 27.7 | 60.3 | 8.2 | 1.2 | 9.4 | 12.7 | 1.2 | 24.3 |
| Oriental | 71.2 | 25.7 | 62.0 | 2.4 | 2.6 | 14.0 | 14.6 | 0.7 | 22.7 |
| Central | 75.3 | 35.0 | 64.0 | 2.5 | 3.4 | 10.1 | 12.7 | 0.6 | 9.0 |
| Pacífica | 76.5 | 39.7 | 69.5 | 5.4 | 2.8 | 15.2 | 10.9 | 2.6 | 8.5 |
| Bogotá | 83.6 | 44.7 | 61.8 | 8.7 | 2.4 | 25.1 | 20.4 | 1.5 | 17.8 |
| SUBREGION | | | | | | | | | |
| Subregión 1 | 65.6 | 31.7 | 60.7 | 7.7 | 1.7 | 11.7 | 10.1 | 1.0 | 15.2 |
| Subregión 2 | 79.6 | 31.8 | 70.1 | 6.8 | 0.6 | 11.2 | 18.0 | 1.6 | 27.0 |
| Subregión 3 | 67.9 | 22.1 | 52.5 | 9.6 | 1.3 | 6.4 | 10.4 | 1.0 | 28.0 |
| Subregión 4 | 74.8 | 32.0 | 60.2 | 2.5 | 2.1 | 17.3 | 19.1 | 1.3 | 22.9 |
| Subregión 5 | 68.1 | 19.6 | 63.7 | 2.4 | 3.0 | 10.8 | 10.2 | 0.0 | 22.5 |
| Subregión 6 | 79.6 | 33.4 | 69.3 | 2.6 | 4.3 | 10.7 | 13.7 | 0.6 | 4.6 |
| Subregión 7 | 77.1 | 40.3 | 58.7 | 2.7 | 2.3 | 11.5 | 10.4 | 0.8 | 9.2 |
| Subregión 8 | 61.6 | 33.1 | 52.7 | 2.0 | 1.9 | 6.0 | 12.6 | 0.4 | 24.4 |
| Subregión 9 | 61.1 | 31.3 | 71.3 | 2.1 | 2.7 | 8.3 | 6.5 | 0.0 | 7.6 |
| Subregión 10 | 84.9 | 43.0 | 68.8 | 6.7 | 2.9 | 18.0 | 12.7 | 3.6 | 8.8 |
| Subregión 11 | 83.6 | 44.7 | 61.8 | 8.7 | 2.4 | 25.1 | 20.4 | 1.5 | 17.8 |
| Subregión 12 | 82.2 | 34.4 | 71.9 | 1.2 | 3.2 | 14.2 | 14.2 | 1.2 | 5.2 |
| Subregión 13 | 86.2 | 44.0 | 69.9 | 4.6 | 2.2 | 14.2 | 11.4 | 1.4 | 7.2 |
| NIVEL EDUCATIVO | | | | | | | | | |
| Sin educación | 45.9 | 17.0 | 45.7 | 6.8 | 0.9 | 3.9 | 7.1 | 0.3 | 16.6 |
| Primaria | 62.5 | 25.0 | 54.7 | 5.2 | 2.7 | 7.0 | 7.4 | 0.6 | 15.2 |
| Secundaria | 85.6 | 38.4 | 66.7 | 4.7 | 2.5 | 17.0 | 16.5 | 1.3 | 15.0 |
| Superior | 95.9 | 51.7 | 79.4 | 7.5 | 3.0 | 26.9 | 25.1 | 3.5 | 19.3 |
| TOTAL | 75.4 | 34.9 | 63.6 | 5.3 | 2.6 | 14.4 | 14.2 | 1.3 | 15.6 |

