

APENDICE D

**TERRITORIOS NACIONALES:
RESULTADOS PRELIMINARES**

APENDICE D

TERRITORIOS NACIONALES: RESULTADOS PRELIMINARES

D.1 ANTECEDENTES

La Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud (EPDS-90) de los Territorios Nacionales se llevó a cabo entre el 8 de Septiembre y el 10 de Octubre de 1990. Comparativamente con el resto del país, representó mayores riesgos para el personal de campo por la situación de orden público que afectaba a casi todos los municipios seleccionados en la muestra y por las dificultades de transporte, propias de estas apartadas regiones.

En principio fué seleccionada una muestra de 112 segmentos pertenecientes a las cabeceras de los siguientes municipios:

ARAUCA: Arauca y Saravena;
CASANARE: Aguazul y Yopal;
PUTUMAYO: Orito y Puerto Asis;
GUAVIARE: Miraflores;
VAUPES: Mitú.

A todos los municipios seleccionados se puede llegar por vía aérea y solo hasta Aguazul y Orito se llegó por vía terrestre desde Yopal y Puerto Asis, respectivamente. Para Miraflores se contrató un vuelo especial. El uso intensivo del transporte aéreo constituye un componente importante del costo total de la encuesta.

Los instrumentos de recolección (cuestionarios y manuales) son los mismos utilizados en la EPDS-90 para los departamentos. Dentro de la planeación de la encuesta se había previsto que, previamente a la recolección, se requería implementar un recuento de viviendas de las manzanas seleccionadas, hacer su partición en medidas de tamaño de 10 viviendas aproximadamente y seleccionar una de estas partes o segmentos para aplicar allí la encuesta. Debido a las deficiencias de la cartografía y a que esta región no se había actualizado para la Muestra Básica del DANE, hubo necesidad de hacer el recuento de viviendas, especialmente en Saravena y Mitú. En algunos casos, la cartografía solo cubría un 30 por ciento, aproximadamente, del tamaño real de las poblaciones seleccionadas y presentaba inconsistencias con las respectivas bases geográficas. Esto llevó a la necesidad de modificar las medidas de tamaño seleccionadas previamente. Solamente los procedimientos de selección fueron aplicados por las supervisoras, aunque en algunos casos el recuento lo realizaron éstas con el apoyo de las encuestadoras. En todos los casos se actualizó la cartografía y se entregó junto con los formularios de recuento y selección de segmentos al muestrista del proyecto. Estos procedimientos fueron revisados y supervigilados por el jefe de trabajo de campo, y verificados en terreno en los casos de Yopal, Arauca y Aguazul.

Los problemas de orden público afectaron principalmente a Saravena y Miraflores. La primera estuvo paralizada durante todo el tiempo de la encuesta debido a un paro cívico; en la segunda no se pudo concluir el recuento de viviendas ni hacer la encuesta, porque la población fué tomada por un grupo guerrillero, lo cual originó combates con el ejército que obligaron a las encuestadoras a abandonar el lugar. Para compensar la pérdida de los 11 segmentos de Miraflores fué seleccionado el municipio de Santiago en el Putumayo.

Como se observa en el cuadro D.1, del total de 1.300 hogares incluidos en la muestra, se encontraron 1.177 hogares y se entrevistaron 1.111, es decir, el 94.4 por ciento. Del total de 1.300 mujeres elegibles

encontradas se realizaron 1.240 entrevistas completas, para una tasa de cobertura del 95.8 por ciento. Las altas tasas de cobertura se debieron en parte a la positiva novedad que despertó la encuesta entre la población.

D.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los principales resultados en lo relacionado con los niveles y preferencias de fecundidad, el uso de métodos de planificación familiar, atención prenatal, niveles de vacunación y prevalencia de la diarrea en niños menores de cinco años se resumen a continuación.

D.2.1 Características de las Mujeres Entrevistadas

En el cuadro D.2 se presenta la distribución de las mujeres en edad fértil. En comparación con las mujeres del resto del país, las de los Territorios Nacionales son más jóvenes, pesando más las menores de 25 años. La proporción de solteras es de 29 por ciento, contra 36 por ciento para el país; hay mayores proporciones de mujeres en unión libre y separadas y menos porcentaje de mujeres casadas.

El promedio de años de educación es 6.1, en comparación con 6.7 años para el total del país. Solamente 4.6 por ciento no tienen ninguna educación y solo 3.8 por ciento tienen educación superior; las demás mujeres tienen educación primaria (45 por ciento) o secundaria (47 por ciento).

D.2.2 Fecundidad

Con los niveles observados de fecundidad por edad, las mujeres de los Territorios Nacionales tendrán en promedio 3.5 hijos al final del período reproductivo. La Tasa General de Fecundidad en 134 hijos por mil mujeres y la Tasa Bruta de Natalidad se estimó en 35 nacimientos por mil habitantes. Estos niveles de fecundidad son muy similares a los de la región Atlántica. La paridez, o promedio de hijos nacidos vivos por mujer, es de 2.1 hijos, superior a la del país pero similar a la de las regiones Atlántica y Oriental.

D.2.3 Planificación Familiar

Las proporciones de todas las mujeres y de las mujeres actualmente en unión que conocen métodos anticonceptivos, las que conocen las fuentes donde éstos se consiguen, aquellas que los han usado alguna vez y los niveles de uso actual se presentan en el cuadro D.4. Como puede verse, tanto el conocimiento de los métodos como de las fuentes es alto, ya sea para las mujeres unidas como para el total de mujeres, aunque los porcentajes son un poco menores que para el resto del país.

El 62 por ciento de todas las mujeres y el 87 por ciento de las mujeres unidas han usado alguna vez métodos de planificación familiar. Estas proporciones son un poco mayores que para el total del país: 58 y 86, respectivamente. Las tasas de prevalencia de uso actual de métodos son 43 por ciento para el total de mujeres y 64 para las mujeres en unión. La primera es superior a la de 40 para el total de los departamentos y la segunda solo un poco inferior a la de 66 obtenida para el resto del país. Es interesante observar que la prevalencia de uso es superior en estas áreas a la de la región Atlántica y solo un poco inferior a los niveles de uso de las regiones Pacífico y Central.

La distribución porcentual de las mujeres unidas por método anticonceptivo usado actualmente según algunas características se presenta en el cuadro D.5. Del total de mujeres unidas el 56 por ciento están usando métodos modernos y 9 por ciento algún método tradicional. El método más usado, como en el resto del país, es la esterilización, 20 por ciento; le siguen la píldora con 14 por ciento y el DIU con 12 por ciento.

En el cuadro D.6 se presentan las fuentes de abastecimiento de los métodos. La totalidad de las esterilizaciones han sido realizadas en los departamentos y no en los Territorios Nacionales.

Las droguerías, los hospitales y PROFAMILIA constituyen las fuentes de suministro para el 84 por ciento de las usuarias de métodos. Las droguerías son la principal fuente de abastecimiento de métodos de

planificación familiar con 38 por ciento, especialmente en lo que se refiere a la píldora, inyecciones, vaginales y condones. En segundo lugar están los hospitales y PROFAMILIA, cada uno con 23 por ciento; los primeros se mencionan, en primer lugar para la inserción del DIU y en segundo lugar para la esterilización y PROFAMILIA en un 63 por ciento para las esterilizaciones y en segundo lugar para el DIU.

D.2.4 Preferencias de Fecundidad

El 42 por ciento de las mujeres actualmente unidas no desea tener más hijos, en tanto que 40 por ciento si desean tener más y un 3 por ciento está indecisa (cuadro D.7). Entre quienes desean tener el primer hijo o un hijo adicional, el 12 por ciento desean tenerlo antes de dos años, en tanto que 18 por ciento de las entrevistadas quieren esperar más de dos años. Las preferencias de fecundidad de las mujeres de los Territorios Nacionales son muy similares a las observadas para el resto del país.

D.2.5 Cuidado Materno

En el cuadro D.8 se presenta la distribución de los niños menores de cinco años según el cuidado materno recibido durante el embarazo y la atención recibida durante el parto. Al 71 por ciento de las mujeres les fué aplicada alguna dosis de la vacuna contra el tétanos, estando más protegidas las mujeres de menor edad, aquellas con menos de 6 hijos y las mujeres con educación primaria o más.

El 79 por ciento de las mujeres recibieron cuidado médico durante el embarazo y el 74 por ciento recibió atención médica durante el parto. La primera proporción es similar y la segunda superior a la del resto del país (80 y 71 por ciento respectivamente). Un 59 por ciento de las mujeres recibieron carnet prenatal durante el embarazo. Del total de madres, el 20 por ciento no se hizo control prenatal y 2.3 por ciento no tuvo ninguna atención durante el parto. La probabilidad de mayor cuidado tanto el prenatal como durante el parto aumenta con la educación y disminuye con el número de hijos.

D.2.6 Vacunación de los Niños

El 57 por ciento de los niños de 12-23 meses tenía carnet de vacunación y 68 por ciento habían recibido todas las vacunas. Como se aprecia en el cuadro D.9, de los niños con un año cumplido el 87 por ciento tenían la vacuna contra BCG; el 78 por ciento tenía la tercera dosis de DPT y la tercera dosis de Polio, en tanto que 79 por ciento habían sido vacunados contra el sarampión. En general puede decirse que los niños que presentan menores niveles de vacunación son los de alto orden de nacimiento (cuarto o más), en tanto que la cobertura aumenta con la educación de las madres. Las niñas aparecen con mayor número de vacunas que los niños.

D.2.7 Prevalencia de Diarrea

El cuadro D.10 detalla las proporciones de niños menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas y el tratamiento que recibieron. Mientras el 6.1 por ciento tuvo diarrea en las últimas dos semanas (en comparación con 4.6 por ciento para el resto del país), la proporción de los que tuvieron esta enfermedad durante las dos últimas semanas, 12.8 por ciento, es muy similar al 12.5 por ciento del resto del país.

Mientras los remedios caseros fueron utilizados en el 41 por ciento de los casos y el 15 por ciento de los niños con diarrea recibieron suero preparado en casa, solamente el 20 por ciento fueron tratados con sales de rehidratación oral (SRO). Las respectivas proporciones para el resto del país eran 40, 18 y 31 por ciento respectivamente.

CUADRO D.1 TERRITORIOS NACIONALES: RESULTADOS DE LA MUESTRA, ENTREVISTAS DE HOGARES Y ENTREVISTAS INDIVIDUALES, EPDS, 1990

Resultado	Número	Porcentaje
HOGARES		
Seleccionados	1300	100.0
Completos	1111	85.5
Ausentes	55	4.2
Rechazos	11	0.8
Vivienda desocupada	123	9.5
Tasa de respuesta		94.4
MUJERES		
Elegibles	1300	100.0
Completa	1240	95.4
Ausente	39	3.0
Rechazo	16	1.2
Otros	5	0.4
Tasa de respuesta		95.8

CUADRO D.2 TERRITORIOS NACIONALES: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS MUJERES EN EDAD FERTIL POR GRUPOS DE EDAD, ESTADO CONYUGAL Y NIVEL EDUCATIVO, EPDS, 1990

Características	Porcentaje ponderado	Número ponderado de mujeres	Número sin ponderar de mujeres
EDAD			
15-19	23.6	11330	295
20-24	22.2	10667	273
25-29	17.1	8236	213
30-34	12.3	5934	151
35-39	11.9	5737	142
40-44	7.6	3648	98
45-49	5.3	2533	68
ESTADO CONYUGAL			
Soltera	29.2	14025	363
Casada	27.3	13112	326
Unión Libre	30.8	14826	392
Viuda	1.6	785	20
Separada	11.1	5336	139
NIVEL EDUCATIVO			
Sin educación	4.6	2217	57
Primaria	44.7	21506	558
Secundaria	46.9	22530	580
Superior	3.8	1833	45
TOTAL	100.0	48085	1240

CUADRO D.3 TERRITORIOS NACIONALES: NÚMERO PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS POR MUJER Y TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD PARA LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, EPDS, 1990

Grupos de Edad	Promedio de hijos nacidos vivos	Tasas de fecundidad (por mil)	Número de mujeres
15-19	0.22	123	11330
20-24	1.23	208	10667
25-29	2.13	173	8236
30-34	2.78	96	5934
35-39	3.76	80	5737
40-44	4.75	26	3648
45-49	5.53	4	2533
TOTAL	2.13	3.55*	48085

*Tasa de Fecundidad Total

CUADRO D.4 TERRITORIOS NACIONALES: PORCENTAJE DE TODAS LAS MUJERES Y DE LAS MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS QUE CONOCEN MÉTODOS, CONOCEN FUENTE DE SUMINISTRO, HAN USADO MÉTODOS ALGUNA VEZ Y ACTUALMENTE ESTÁN USANDO, EPDS, 1990

Método	Conoce algún método		Conoce alguna fuente de método		Alguna vez ha usado		Actualmente utilizando	
	Total	Unidas	Total	Unidas	Total	Unidas	Total	Unidas
Algún Método	98.1	99.8	94.2	97.9	62.0	86.6	43.0	64.4
Algún Método Moderno	98.0	99.6	94.2	97.9	56.5	80.2	37.1	55.5
Píldora	96.1	98.8	90.4	95.5	38.8	55.6	9.5	14.2
DIU	86.8	94.6	80.0	89.3	23.3	34.1	8.4	12.0
Inyección	87.1	94.0	80.2	88.4	13.4	20.9	2.5	3.7
Vaginales	77.8	85.3	73.9	82.2	13.3	20.2	1.8	3.0
Condón	79.6	83.5	74.4	79.2	7.8	11.3	2.0	2.7
Esterilización Femenina	92.0	94.9	85.0	90.5	13.0	19.8	13.0	19.8
Vasectomía	48.7	54.0	43.2	48.9	-	-	-	-
Algún Método Tradicional	66.2	74.2	43.3	47.8	20.7	28.4	5.9	8.9
Abstinencia Periódica	58.9	65.5	43.3	47.8	13.9	18.8	3.8	5.3
Retiro	44.0	50.3	0.0	0.0	9.4	14.0	1.6	2.7
Otros	10.6	11.8	0.0	0.0	2.3	2.6	0.5	0.9

Nota: Número total de mujeres: 48.085; número de mujeres actualmente unidas: 27.939.

CUADRO D.5 TERRITORIOS NACIONALES: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES UNIDAS POR MÉTODO USADO ACTUALMENTE, SEGÚN EDAD, NIVEL EDUCATIVO Y NÚMERO DE HIJOS, EPDS, 1990

	Cual- quier método	Méto- dos moder- nos	Pil- dora	DIU	Inyec- ciones	Vagi- nales	Con- dón	Esteri- lización feme- nina	Méto- dos tradi- cionales	Absti- nencia perió- dica	Retiro	Otros méto- dos	Total	Número de mujeres
EDAD														
15-19	30.8	21.7	12.7	0.8	2.5	3.3	2.4	0.0	9.1	6.6	2.5	0.0	100.0	2040
20-24	58.4	51.4	19.3	15.8	9.7	3.0	2.3	1.3	7.0	3.6	2.5	0.9	100.0	5840
25-29	68.7	59.5	20.2	10.2	6.1	3.1	2.2	17.6	9.2	6.3	1.4	1.4	100.0	6247
30-34	71.7	64.7	15.8	22.4	0.6	0.3	4.2	21.5	6.9	2.3	3.7	1.0	100.0	4717
35-39	71.2	60.8	8.4	9.6	0.0	6.5	2.4	33.9	10.5	9.7	0.8	0.0	100.0	4910
40-44	72.7	58.3	4.6	9.1	0.5	2.4	4.1	37.6	14.4	5.7	6.7	2.0	100.0	2785
45-49	54.2	48.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	5.7	0.0	4.6	1.2	100.0	1400
NIVEL EDUCATIVO														
Sin educación	49.2	37.6	6.4	5.6	1.0	0.0	3.1	21.5	11.6	7.8	2.7	1.1	100.0	1466
Primaria	63.5	53.0	13.7	6.3	4.1	3.5	1.3	24.1	10.5	5.7	4.2	0.6	100.0	13487
Secundaria	67.6	60.8	15.7	19.4	4.0	3.0	2.0	16.7	6.7	4.5	1.2	1.0	100.0	11744
Superior	61.9	52.4	15.4	12.7	0.0	1.0	23.3	0.0	9.5	5.7	0.0	3.7	100.0	1242
NUMERO DE HIJOS VIVOS														
Ninguno	16.2	11.7	7.7	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	100.0	2454
Uno	49.1	42.5	18.2	14.7	2.7	3.8	1.7	1.4	6.6	4.8	1.8	0.0	100.0	4446
Dos	72.0	63.1	20.1	19.5	7.2	3.7	5.0	7.5	8.9	5.5	2.7	0.7	100.0	7639
Tres	73.5	62.6	14.5	12.3	3.0	3.7	2.5	26.6	10.9	6.9	3.1	0.9	100.0	5328
Cuatro o más	74.2	64.0	8.3	7.0	1.4	2.2	2.0	43.1	10.2	4.6	3.7	2.0	100.0	8072
TOTAL	64.4	55.5	14.2	12.0	3.7	3.0	2.7	19.8	8.9	5.3	2.7	0.9	100.0	27939

CUADRO D.6 TERRITORIOS NACIONALES: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE USUARIAS ACTUALES DE MÉTODOS MODERNOS POR FUENTE DE SUMINISTRO, EPDS, 1990

Fuente de suministro	Píldora	DIU	Inyec- ciones	Vagi- nales	Condón	Esteri- lización femenina	Total
Hospital/Centro o Puesto Salud	7.2	53.5	0.0	0.0	6.9	25.2	23.1
PROFAMILIA-Clínica	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	62.6	23.0
PROFAMILIA- Puesto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1
Clínica Privada	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	8.7	4.8
Médico Particular	0.3	22.6	5.4	0.0	0.0	1.6	6.1
Droguería	88.3	0.0	94.6	91.7	81.3	0.0	37.8
Caja de Compensación	2.1	0.6	0.0	5.4	0.0	0.0	0.9
Seguro Social	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Cajanal	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1
Otro	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
No sabe	1.0	0.0	0.0	2.9	11.8	0.0	1.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de mujeres	4564	4021	1218	856	948	6239	17846

CUADRO D.7 TERRITORIOS NACIONALES: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, POR INTENCIÓN REPRODUCTIVA, SEGÚN EDAD, EPDS, 1990

Edad de la mujer	Desea pronto	Desea esperar	Indecisa	No desea	Esterilizada	Infértil	No responde	Total	Número de mujeres
15-19	10.4	41.8	0.6	40.5	0.0	0.0	6.7	100.0	2040
20-24	13.0	37.6	5.3	41.2	1.3	0.0	1.7	100.0	5840
25-29	11.4	24.7	2.9	40.8	17.6	0.6	2.0	100.0	6247
30-34	17.2	8.8	3.9	44.5	21.5	3.2	0.9	100.0	4717
35-39	9.4	2.9	3.3	43.2	33.9	6.5	0.8	100.0	4910
40-44	9.0	0.0	0.5	45.5	37.6	7.4	0.0	100.0	2785
45-49	0.0	0.0	0.0	36.5	45.0	18.4	0.0	100.0	1400
TOTAL	11.5	18.4	3.1	42.2	19.8	3.5	1.6	100.0	27939

CUADRO D.8 TERRITORIOS NACIONALES: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS POR TIPO DE CUIDADO PRENATAL RECIBIDO Y TIPO DE ATENCIÓN DURANTE EL PARTO, SEGÚN EDAD DE LA MADRE, ORDEN DE NACIMIENTO Y NIVEL EDUCATIVO, EPDS, 1990

Características	Toxoide tetánico	Atención médica prenatal	Atención médica del parto	Número de nacimientos
EDAD				
Menos de 20	74.8	74.8	78.3	6642
20-34	71.0	82.7	75.2	19485
35 o más	55.1	60.2	52.5	2209
ORDEN DE NACIMIENTO				
Primero	70.9	83.1	84.5	8621
Segundo, Tercero	72.2	80.9	74.8	12933
Cuarto a Sexto	70.8	77.6	68.4	5078
Séptimo y más	57.2	49.8	33.5	1706
NIVEL EDUCATIVO				
Sin educación	55.0	69.3	67.6	5780
Primaria	67.4	71.0	66.3	3860
Secundaria	77.0	89.0	82.9	18309
Superior	60.6	94.3	95.4	387
TOTAL	70.7	79.1	74.1	28337

CUADRO D.9 TERRITORIOS NACIONALES: PORCENTAJE DE NIÑOS DE 12-23 MESES CON CARNET DE VACUNACIÓN REVISADO POR LA ENCUESTADORA Y PORCENTAJE VACUNADO SEGÚN EL CARNET O EL INFORME DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL NIÑO, ORDEN DE NACIMIENTO Y NIVEL EDUCATIVO, EPDS, 1990

Características	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Saram- pión	Todas las vacunas	Nin- guna	Mostró carnet	Núme- ro de niños
SEXO												
Masculino	81.7	89.5	81.1	73.4	90.8	82.5	73.4	70.2	60.2	7.1	54.9	3368
Femenino	94.3	95.2	95.2	83.0	95.2	95.2	83.0	89.3	77.7	4.8	60.0	2714
ORDEN DE NACIMIENTO												
Primero	96.7	96.7	96.7	93.0	96.7	96.7	93.0	91.0	88.3	3.3	65.8	1541
Segundo, Tercero	86.8	90.8	88.4	79.0	92.5	90.1	79.0	82.1	70.9	7.5	56.5	2769
Cuarto a Sexto	86.3	93.1	80.8	63.7	93.1	80.8	63.7	65.0	49.1	1.8	52.6	1361
Séptimo y más	59.2	78.9	67.4	57.3	78.9	67.4	57.3	55.2	35.1	21.1	44.7	412
NIVEL EDUCATIVO												
Sin educación	83.1	83.1	79.1	58.3	83.1	79.1	58.3	39.6	30.2	16.9	41.0	301
Primaria	80.4	85.6	78.2	65.7	87.2	79.8	65.7	73.5	58.0	10.6	55.3	3020
Secundaria	95.2	100.0	98.3	92.7	100.0	98.3	92.7	88.4	82.6	0.0	61.5	2675
Superior	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	44.8	87
TOTAL	87.3	92.0	87.4	77.7	92.8	88.2	77.7	78.7	68.0	6.1	57.2	6083

CUADRO D.10 TERRITORIOS NACIONALES: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON DIARREA EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS Y EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS Y QUE RECIBIERON SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL O SUERO CASERO, SEGÚN EDAD Y SEXO DEL NIÑO, ORDEN DE NACIMIENTO Y NIVEL EDUCATIVO, EPDS, 1990

Características	En las últimas 24 horas	En las últimas 2 semanas*	Sales de rehidratación oral	Suero Casero	Otros medicamentos	Menores de 5 años
EDAD DEL NIÑO						
Menos de 6 meses	0.6	5.9	54.8	19.3	35.9	2185
6-11 meses	9.7	23.1	16.7	24.7	46.3	2649
12-23 meses	15.0	26.2	14.7	14.7	33.9	6083
24-35 meses	4.6	9.7	22.4	19.0	52.3	6290
36-47 meses	4.5	8.5	34.7	2.6	46.1	5460
48-59 meses	0.3	4.1	7.1	0.0	43.3	5670
SEXO						
Masculino	5.6	13.8	20.2	15.3	40.8	15752
Femenino	6.8	11.7	19.3	14.1	42.0	12585
ORDEN DE NACIMIENTO						
Primero	5.8	13.3	13.7	14.4	31.7	8621
Segundo, Tercero	5.6	13.4	28.4	10.4	41.8	12933
Cuarto a Sexto	6.7	10.5	13.2	36.1	47.8	5078
Séptimo y más	10.2	12.9	0.0	0.0	71.8	1706
NIVEL EDUCATIVO						
Sin educación	12.6	13.7	0.0	0.0	67.0	1151
Primaria	5.9	14.0	19.4	8.4	40.8	14541
Secundaria	6.0	12.0	23.1	26.0	37.9	11798
Superior	3.7	3.7	0.0	0.0	100.0	846
TOTAL	6.1	12.8	19.8	14.8	41.3	28337

*Incluye a los que han tenido diarrea en las últimas 24 horas