

40
Años

Profamilia 

Programa Nacional de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva

**Evaluación de Impacto
Región Atlántica**

**Segunda Encuesta Nacional en Zonas Marginadas
2005**

Gabriel Ojeda Ph.D

OBJETIVO PRINCIPAL

**MEDIR EL IMPACTO DEL
PROGRAMA EVALUANDO LOS
CAMBIOS EN EL CONJUNTO
DE LAS MUJERES
RESIDENTES EN LAS ZONAS
DE INFLUENCIA**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EVALUAR LOS CAMBIOS EN:

- **CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS**
- **FUENTES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE PF**
- **CONOCIMIENTO DEL SGSSS**
- **COBERTURA DEL SGSSS**
- **DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD**
- **CONOCIMIENTO Y HÁBITOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICAL Y DE SENO**
- **CONOCIMIENTO Y HÁBITOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ITS Y EL SIDA**
- **NIVELES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

MUNICIPIOS EN EL PROGRAMA Y EN LA MUESTRA Y NÚMERO DE SEGMENTOS DE LA MUESTRA

Región	Población Cabecera 2005	Población desplazada 2005	Municipios del programa	Municipios en la muestra
Atlántica	5,282,466	23,736	42	8
Oriental	3,027,561	18,140	24	5
Central	5,238,411	19,144	31	5
Pacífica	3,849,277	28,111	21	4
Bogotá/Soacha	7,480,089	20,545	2	2
Total	24,877,804	109,676	120	24

CUESTIONARIOS DE LA ENCUESTA

- **CUESTIONARIO DEL HOGAR**
- **CUESTIONARIO INDIVIDUAL**

EN LA SEGUNDA ENCUESTA SE INCLUYERON ALGUNAS PREGUNTAS ESPECÍFICAMENTE A LAS MUJERES DESPLAZADAS PARA ESTABLECER SI EL DESPLAZAMIENTO REPRESENTÓ MEJORA O DETERIORO DE SU ENTORNO COMUNITARIO MÁS CERCANO, Y ENTENDER LA NATURALEZA DE LA VIOLENCIA (INTIMIDACIÓN, FÍSICA Y SEXUAL) DE LA CUAL HAN SIDO OBJETO


NÚMERO DE ENTREVISTAS Y TASAS DE RESPUESTA

	REGIÓN ATLANTICA	REGIÓN ORIENTAL	REGIÓN CENTRAL	REGIÓN PACÍFICA	BOGOTÁ	TOTAL
HOGARES	462	493	386	400	422	2163
TASA DE RESPUESTA	88	89	81	80	84	85
MUJERES	516	541	413	431	478	2379
TASA DE RESPUESTA	86	89	85	78	87	85


TRABAJO DE CAMPO

- **6 GRUPOS**
- **1 SUPERVISORA**
- **4 ENTREVISTADORAS**
- **20 DÍAS EFECTIVOS DE TRABAJO**

CONDICIONES HABITACIONALES DE LOS HOGARES




CONDICIONES HABITACIONALES DE LOS HOGARES




CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO


Primera Segunda



CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES




AUTONOMÍA DE LAS MUJERES




- Gasta todo su ingreso en el hogar
- Tiene la última palabra en todas las decisiones
- Considera que una mujer puede rehusarse a tener R.S.

INFORMACION SOBRE SALUD



- Considera que la salud es un derecho
- No está afiliada al SGSSS
- No conoce derechos como afiliada al SGSSS

PARTICIPACIÓN EN CHARLAS SOBRE SALUD




■ No ha participado en charlas sobre SBF


■ No ha participado en charlas de SSR

■ No ha participado en charlas sobre DS

Asistió a charlas de prevención en salud de asesora de Profamilia




DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD




- Mujeres de 13 a 49 años actualmente embarazadas
- Mujeres de 15 a 49 años actualmente embarazadas
- Mujeres de 13 a 19 años que están embarazadas del primer hijo


MUJERES ACTUALMENTE EMBARAZADAS QUE NO DESEABAN EMBARAZO




MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A CONTROL PRENATAL




PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS A MUJERES DE 40 - 49 AÑOS




CONOCIMIENTO DE METODOS DE PF




USO ACTUAL DE MÉTODOS DE PF




USUARIAS QUE OBTUVIERON EL MÉTODO EN PROFAMILIA



MUJERES QUE NO IDENTIFICAN EL MOMENTO MÁS FÉRTIL DEL CICLO MENSTRUAL




CONTACTO CON EL TEMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR




- No usuarias que discutieron sobre PF en un establecimiento de salud
- No usuarias visitadas por trabajador en PF el año anterior

CONOCIMIENTOS SOBRE VIH-SIDA




- No conoce como establecer si una persona está infectada con VIH
- No sabe cómo evitar su contagio

CONOCIMIENTOS SOBRE VIH-SIDA




- Se puede evitar usando condón
- Una persona de apariencia saludable puede tener SIDA
- Se ha hecho prueba del SIDA

PORCENTAJE DE MUJERES QUE NO CONOCE LA CITOLOGÍA VAGINAL




MUJERES QUE SE HAN HECHO LA CITOLOGÍA




■ Necesitó consulta con el ginecólogo y no fue
■ Acudió a Profamilia para el último examen


MUJERES QUE CONOCEN LA CITOLOGÍA VAGINAL Y NO HAN PARTICIPADO EN CHARLAS SOBRE ESTE TEMA



PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONOCE LA CITOLOGÍA VAGINAL Y PARTICIPO EN CHARLAS DE PROFAMILIA SOBRE ESTE TEMA




AUTOEXAMEN DE SENO




- No conoce el autoexamen de seno
- Se ha hecho el autoexamen de seno


PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONOCE EL AUTOEXAMEN DE SENO Y NO HA PARTICIPADO EN CHARLAS SOBRE ESTE TEMA




PORCENTAJE DE MUJERES QUE CONOCE EL AUTOEXAMEN DE SENO Y PARTICIPÓ EN CHARLAS DE PROFAMILIA SOBRE ESTE TEMA



PORCENTAJE DE MAU QUE HA SUFRIDO VIOLENCIA FISICA POR PARTE DEL CÓNYPUGE



MAU QUE SUFRIERON VIOLENCIA FÍSICA Y TUVIERON ALGUNA LESIÓN



CONCLUSIONES

Esta segunda encuesta desarrollada a nivel nacional, documenta resultados positivos e importantes en las diferentes variables relacionadas con salud sexual y, sin embargo se ve que los hogares y las mujeres de zonas marginales y en especial los de desplazados debido al conflicto armado siguen mostrando las condiciones más desfavorables.

RECOMENDACIONES

Fortalecer e incrementar el ofrecimiento de información , labores educativas y servicios médico-clínicos en la población desplazada y vulnerable, asegurando siempre que se respeten sus derechos y sus diferencias.

CONSIDERACIÓN FINAL

Debido a la magnitud del problema de los desplazados, se debe partir del principio que la situación no es solamente responsabilidad del sector salud; sino que debe reconocerse que está íntimamente relacionada con condiciones políticas, sociales y culturales que demanda asumir una responsabilidad multisectorial.

Muchas gracias....